per
sée

Bulletin de la Société
entomologique de France

A propos de l'*Ascalaphus longicornis* L. en Champagne [Neur.]

Louis Demaison

Citer ce document / Cite this document :

Demaison Louis. A propos de l'*Ascalaphus longicornis* L. en Champagne [Neur.]. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 38 (6),1933. p. 96;

doi : https://doi.org/10.3406/bsef.1933.14547

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1933_num_38_6_14547

Ressources associées :

Ascalaphus longicornis

Fichier pdf généré le 18/03/2022

BY: $ = creative commons

Tête marquée de points extrêmement fins; front très saillant, tubercules frontaux très développés, transversalement triangulaires, contigus; vertex offrant une dépression transverse à la partie antérieure. Antennes dépassant les épaules, premier article renflé, deuxième un peu plus gros mais presque aussi long que le troisième, quatrième plus long que le précédent, les suivants plus épais, chacun d'eux presque aussi long que le quatrième. Prothorax deux fois plus large à la base que long, bords latéraux très légèrement arqués; bord antérieur échancré, le postérieur sinué de chaque côté et arrondi-dilaté au milieu; angles antérieurs avancés, les postérieurs presque droits, saillants; snrface marquée d'une ponctuation fine, éparse et uniforme, impressions basilaires peu distinctes. Scutellum en triangle curviligne, imponctué. Élytres presque aussi larges à la base que le prothorax, leur ponctuation serrée, ne montrant qu'une tendance à se ranger en lignes irrégulières; espace marginal ponctué comme le disque surtout en arrière où il est déprimé; épipleures longitudinalement creusés, marqués de points peu serrés à la partie interne.

Dessous du corps couvert de points pilifères; prosternum longitudinalement creusé entre les hanches; cuisses postérieures médiocrement renflées.

Cette espèce est remarquable par sa coloration et par le développement de ses tubercules frontaux. Elle se distingue facilement de ses congénères.

A propos de l'*Ascalaphus longicornis* L. en Champagne [Neur.]

par L. Demaison.

Dans la séance du 28 janvier 1914, j'ai signalé la découverte très intéressante qui avait été faite pendant l'été de 1908 d'un Névroptère méridional, l'*Ascalaphus longicornis* L., à Beine, en la plaine champenoise, à l'Est de Reims (*Bulletin* [1914], p. 93). De nouvelles captures ont été faites en 1930 dans notre région. Nous en devons la connaissance à M. Lucien Bellevoye qui nous en a rendu compte dsns le dernier *Bulletin de la Société d'Étude des Sciences naturelles de Reims* [1930-31], p. 10. M. Caruel en a pris un exemplaire le 20 juin 1930, près de Courcy, aux environs de Reims. Un couple, mâle et femelle, a été trouvé le 30 juin à Châlons-sur-Vesle. Enfin M. Bellevoye en a capturé lui-même deux exemplaires le 2 juillet au Mont-Aimé, en face de Vertus. Cette espèce paraît donc assez fréquemment en Champagne, soit qu'elle y soit réellement acclimatée, soit qu'elle y fasse seulement des visites en été dans les années favorisées d'une haute température.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C^ie^. — MESNIL (EURE). — 1933.

Persée creative commons