

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

ENT
QL
577
L12
1896a

Digitized by Google

ALBERT R. MANN
LIBRARY
AT
CORNELL UNIVERSITY




Digitized by Google

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 062 805 225

DATE DUE

RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY
Cornell University
Ithaca, N. Y.

Digitized by Google


Digitized by Google

Production Note

Cornell University Library produced this volume to replace the irreparably deteriorated original. It was scanned using Xerox software and equipment at 600 dots per inch resolution and compressed prior to storage using CCITT Group 4 compression. The digital data were used to create Cornell's replacement volume on paper that meets the ANSI Standard Z39.48-1984. The production of this volume was supported in part by the Commission on Preservation and Access and the Xerox Corporation. Digital file copyright by Cornell University Library 1991.

Digitized by Google

Digitized by Google



BOUGHT WITH THE INCOME OF THE
COMSTOCK ENDOWMENT FUND,
THE GIFT OF
JOHN HENRY COMSTOCK
AND THE
STUDENT MEMORIAL FUND,
GIFT OF STUDENTS IN ENTOMOLOGY

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES

DES

ENVIRONS DE REIMS

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES

DES

ENVIRONS DE REIMS

PAR A. LAJOYE

Membre de la Société entomologique de France

et de plusieurs Sociétés savantes

2e ÉDITION

AUGMENTÉE ET ENTIÈREMENT REMANIÉE



REIMS

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE L'INDÉPENDANT RÉMOIS

40, Rue de Talleyrand, 40

1896

Digitized by Google

ENT
QL
577
L12
1896a

ABRÉVIATIONS

R.	Assez rare.
RR.	Rare.
RRR.	Très rare.
C.	Assez commun.
CC.	Commun.
CCC.	Très commun.
loc. dét.	Localité détruite.
var.	Variété.
s. g.	Sous genre.
?.	Espèce douteuse.
♂.	Mâle.
♀.	Femelle.
+.	Indique que l'on trouve l'espèce dans toute la région.
!.	Indique une espèce trouvée à Reims même, ou dans les champs autour de la ville.

Digitized by Google

Par suite d'observations nombreuses, faites depuis la publication en 1878 de mon Catalogue des Coléoptères des environs de Reims, il était nécessaire que cet ouvrage fût remanié avant d'en publier la suite; c'est pourquoi le travail que je donne aujourd'hui n'est pas une continuation de mon premier Catalogue, c'est une œuvre entièrement nouvelle et qui cependant, malgré mes efforts, sera encore bien incomplète.

Désigner exactement les limites géographiques de la faune qui nous occupe est assez difficile; j'ai compris dans ce travail la région qui serait renfermée dans une ligne passant par Rethel, Guignicourt, Fismes, Epernay, Châlons-sur-Marne, et si j'ai mentionné certaines espèces trouvées un peu en dehors de cet espace, c'est qu'étant persuadé que ces insectes doivent se trouver dans notre région, un heureux hasard les fera capturer tôt ou tard.

LAJOYE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES

DES

ENVIRONS DE REIMS

CICINDELIDES

CICINDELA. — Linné.

Campestris, Linn. — Dans les endroits sablonneux (cc), se montre dès les premiers beaux jours. (Rilly, Hermonville, Germaine, etc.)

Hybrida, Linn. — Dans les endroits sablonneux, et exposés au soleil (cc), se trouve très rarement en compagnie de la précédente. (Merfy, Rilly.)

Germanica, Linn. — Dans les champs de céréales, surtout sur les sentiers (r), vole peu et bas, mais court très vite; a surtout été recueillie dans les environs de la Porte Paris.

Digitized by Google

CARABIDES

ELAPHRIDÆ

OMOPHRON. — Latreille.

Limbatus, F. — En Juin et Juillet (R), au bord des eaux courantes, enterré dans le sable ou parmi les racines des plantes, quelquefois courant à la surface du sable. (Epernay, Châlons-sur-Marne, au bord de la Marne.)

NOTIOPHILUS. — Dumeril.

Aquaticus, L. — Sous les mousses et les herbes dans les bois (C), presque toute l'année (Germaine, Merfy.)

Palustris, Duft. — Dans les mêmes conditions que le précédent (C). (Merfy, Berru, etc.)

Biguttatus, F. — Sous les mousses dans les bois, surtout les bois de sapin (C), presque toute l'année. (Merfy, Brimont, Berru.)

Rufipes, Curt. — Dans les mêmes localités et conditions que les précédents (R).

ELAPHRUS. — Fabricius.

Cupreus, Duft. — Sur le gravier au bord de l'eau, surtout dans les marais. (Muizon, Compensé (Ninin) (RR).

Riparius, L. — Sur le gravier au bord des eaux courantes (C), d'Avril à Août. (Au bord de la Marne, Ay, Epernay.)

Digitized by Google

BLETHISA. — Bonelli.

Multipunctata, Linn. — Au bord des eaux, des mares, dans les marécages, sous des détritus mêlés de vase, cachées sous les herbes (rrr), (Berru, Epernay, au bord de la Marne, Rilly.) En Juin et Juillet, Camp de Châlons (Lebœuf).

CARABIDÆ

NEBRIA — Latreille.

Brevicollis, F. — Presque toute l'année, sous les écorces, au pied des arbres, sous les pierres, les herbes sèches, etc. (ccc), +.

LEISTUS. — Frœlich.

Spinibarbis, F. — Sous la mousse au pied des arbres, dans les sablières, sous les écorces, etc. (cc), toute l'année, +.

Ferrugineus, L. — Dans les endroits humides, marécages, etc., sous les herbes et les mousses, quelquefois mais rarement dans les sablonnières (r). Mars et Avril. (Thuizy, Merfy.)

Piceus, Frœhl. — Cette espèce fort rare, qui se trouve dans les champignons, sous les pierres, etc., et qui est considérée comme étant propre aux régions montagneuses, a été communiquée à M. Ad. Bellevoye, comme ayant été trouvée à Rethel.

PROCRUSTES — Bonelli.

Coriaceus, Lin. — Dans les champs, les vignes, les forêts, sous les pierres, les gerbes, etc. (cc) +.

Digitized by Google

CARABUS. — Linné.

Catenulatus, Scop. — Sous les mousses, les pierres, etc. (r). (Guignicourt (Ardennes), toute l'année.)

Monilis, F. — Dans les champs, sous les gerbes ou courant sur les chemins, tant le type que les variétés *consitus*, Panz. et *monilis*, F. (cc), +.

Cancellatus, Illig. — Sous les pierres, les mousses, etc., dans les champs, dans les jardins (r). (Guignicourt, Rethel.)

Arvensis, Herbst. — Trouvé dans les environs de Sedan ; peut-être que des recherches plus actives le feraient trouver dans nos environs immédiats.

Granulatus, Lin. — Dans les endroits humides, bois, marais, prairies, etc., sous les mousses, les herbes, aussi dans le terreau des vieux arbres, sous les écorces (c). Trouvé une fois en nombre dans un vieux saule (marais de Jonchery) et sous des écorces de platane (ancien Bois-d'Amour, loc. détr.).

Auratus, Lin. — Dans les champs, les jardins, etc., courant à terre à la recherche des lombrics, limaces, insectes, etc. (ccc), rarement sous les pierres, les gerbes, etc. Outre le type, on trouve plusieurs belles variétés, telles que : var. *picipes*, Letzn., var. *Catalaunicus*, Gehin (noir avec les pattes fauves). Cette dernière variété se trouve communément certaines années au camp de Châlons, +.

Auronitens, F. — Presque toute l'année sous la mousse, au pied des arbres, des chênes surtout, aussi sous les copeaux humides, après les coupes de bois, quelquefois sous des abris divers, autour des endroits où on a fait du charbon (cc). (Germaine, Rilly.)

Digitized by Google

Purpurascens, F. — Sous les pierres, les troncs abattus, les mousses (printemps et été) (RR). (Jonchery, Cormontreuil, Guignicourt.)

Nemoralis, MULL. — Dans les bois, sous les mousses, au pied des arbres, sous les pierres surtout, aussi dans les sablonnières, enfoncés dans des trous (C), +.

Convexus, F. — Comme les précédents, mais de préférence dans les endroits humides et même marécageux (R), +.

CALOSOMA. — WEBER.

Sycophanta, LIN. — Dans les bois, principalement sur les chênes, souvent pris au vol. N'a jamais été pris dans nos environs immédiats que sous forme de débris bien reconnaissables, paraît assez commun certaines années dans les Ardennes.

Inquisitor, LIN. — Dans les bois, sous la mousse au pied des chênes ou sur les troncs de ces mêmes arbres, très commun les années d'éclosion; la var. bleue est beaucoup plus rare que le type. (Rilly, Germaine.)

CYCHRUS. — FABRICIUS.

Rostratus, L. — Dans les bois, sous les mousses, les feuilles, les pierres (RRR), (Pévy). M. Demaison a trouvé à Amifontaine (Aisne), la var. *elongatus*, SERV.

Attenuatus, F. — Trouvé en avril sous des feuilles mortes, à Germaine (RRR).

Digitized by Google

DRYPTIDAE

ODACANTHA. — Paykull.

Melanura, L. — Dans les marais, en janvier et février, en coupant longitudinalement le haut des tiges des petits roseaux coupés l'année précédente ; en avril et mai, sous les tas d'herbes dans les marais (c). (Thuisy, Muizon, Jonchery.)

DRYPTA. — Fabricius.

Dentata, Rossi. — Sous les herbes sèches, dans les endroits marécageux ; sous les pierres au bord des eaux ; aussi au pied des arbres dans les endroits humides ; commencement du printemps et automne (rr). (Marais de Muizon, source des Trois-Fontaines.)

POLYSTICHUS. — Bonelli.

Vittatus, Brullé. — Au pied des ormes bordant le chemin d'Ay à Epernay par la prairie, en compagnie du *brachynus crepitans*, en mars et avril (loc. détr.) (r).

BRACHYNIDAE

BRACHINUS. — Weber.

Crepitans, L. — Au pied des arbres et sous divers abris dans les champs, gerbes, pierres, etc. (cc), +.

Digitized by Google

Explodens, Duft. — Dans les mêmes conditions que le précédent (ccc), +.

Sclopeta, F, — Comme les précédents (ccc), +.

DROMIDAE

CYMINDIS. — Latreille.

Axillaris, F. — Dans les terrains sablonneux exposés au midi, à la racine de certaines plantes (mauves, plantain, etc.), (rrr). (Germaine, Trigny.)

AËTOPHORUS. — Schmidt-Goebel.

Imperialis, Germ. — Dans les mêmes conditions et localités que *Odacantha melanura* (r). Trouvé deux fois en avril, var. *ruficeps*, Gené, sous des tas d'herbes sèches. (Marais de Thuisy.)

DEMETRIAS. — Bonelli.

Unipunctatus, Germ. — Au printemps en arrachant les herbes au pied des arbres, dans les endroits humides, ou en secouant les herbes dans les marais (cc). (Thuisy, Jonchery, Muizon.)

Atricapillus, L. — Comme le précédent et aussi en secouant de vieux fagots dans les bois (cc). (Rilly, Merfy.)

DROMIUS. — Bonelli.

Linearis, Ol. — Dans les vieux fagots et sous les écorces, l'hiver et au printemps (c), plus rare l'été. (Germaine, Cernay, Merfy.)

Digitized by Google

Agilis, F. — Comme le précédent, mais surtout sous les écailles de platane (c). On trouve aussi dans les mêmes conditions mais plus rarement, la var. *fenestratus*, DÉJ., +.

4. Maculatus, L. — Sous les écorces, principalement sous les écailles de platane, l'hiver et le printemps surtout (CCC), +.

4. Notatus, PANZ. — Comme le précédent (CCC) +.

Sigma, ROSSI. — Sous des détritus végétaux, au bord de la Marne. (Ay) (RRR).

Melanocephalus, DÉJ. — Dans les marais sous les tas d'herbes, aussi dans les fagots dans les endroits humides (CCC), +.

BLECHRUS. — MOTSCHULSKI.

Glabratus, DUFT. — Sous la mousse, dans les bois au pied des arbres, etc. (c), +.

METABLETUS. — SCHMIDT-GOEBEL

Truncatellus, L. — Sous la mousse, au pied des arbres (RR)!

Foveloa, GYLL. — Au pied des arbres, sous les mousses, les feuilles sèches, etc. (c), +.

Obscuroguttatus, DUFT. — Dans les détritus d'inondation, au bord de la Marne. (Epernay, Ay) (RR).

LEBIA. — LATREILLE.

Cyanocephala, L. — Au printemps, au pied des murs, à l'automne, sous les écorces, les mousses, etc., de préférence dans les endroits sablonneux (RR). (Trigny, Merfy.)

Digitized by Google

Chlorocephala, Hoffm. — Sous les tas d'herbes sèches dans les marais, au printemps et à l'automne (rr). (Reims : Fléchambault, Muizon.)

Cyathigera, Rossi. — Un exemplaire trouvé sur un trottoir par M. Warnier.

Crux-Minor, L. — Sous des herbes humides, au bord de la Marne (Epernay), en battant des arbustes en été (rr). (Berru, Germaine.)

Haemorrhoïdalis, F. — L'été en battant les haies, les buissons; au printemps au pied des arbres. Trouvé une fois en nombre à Germaine, en battant des genévriers en septembre (c), +.

DITOMIDAE

ARISTUS. — Latreille.

Clypeatus, Rossi. — Pris à Avize (Béthune), sur des graminées (rr). Cette espèce se trouve plus ordinairement sous les pierres dans les endroits arides.

SCARITIDAE

CLIVINA. — Latreille

Fossor, L. — Au bord des eaux dans le sable, ou sous les pierres et divers abris (r), +.

Collaris, Herbst. — Comme le précédent (rr), +.

DYSCHIRIUS. — Bonelli.

Globosus, Herbst. — Sous les herbes sèches dans les marais, sous les pierres au bord des eaux (cc), +.

Digitized by Google

Æneus, DÉJ. — Sous les pierres au bord de la Marne (Ay), aussi dans les bois sous les mousses (R). (Brimont.)

Politus, DÉJ. — Au bord des eaux, quelquefois dans les bois (RR). (Ay.)

Nitidus, DÉJ. — En fouillant le sable au bord de la Marne en avril. (Ay) (RRR).

CHLAENIDAE

LORICERA. — LATREILLE.

Pilicornis, F. — Sous divers abris : pierres, herbes, etc., dans les endroits marécageux (R), +.

PANAGAEUS. — LATREILLE.

Crux major, L. — Sous la mousse et les herbes dans les bois; aussi dans les mousses sous des détritus végétaux (C), +.

4. **Pustulatus**, STURM. — Au pied des arbres dans les endroits sablonneux. (Merfy) (RR).

CALLISTUS. — BONELLI.

Lunatus, F. — Dans les endroits secs, sous les pierres, les plantes, etc., souvent par groupes (R), +.

CHLAENIUS. — BONELLI.

Velutinus, DUFT. — Indiqué comme trouvé dans le département de la Marne par M. de Saint-Marceaux (J. Chalette père. — Précis de la statistique générale du département de la Marne. — Châlons 1894.)?

Digitized by Google

Agrorum, Ol. — Mai et Juin, à Ay, sous les pierres du bord de la Marne (rr).

Vestitus, Payk. — En Mars et Avril, au même endroit et dans les mêmes conditions que le précédent (r).

Schranki, Duft. — Dans les bois, sous la mousse près des sources (Rilly, Germaine); dans les marais sous les herbes (Muizon) (r). Dans les mêmes conditions, on trouve aussi la var. *tibialis*, Déj.

Nigricornis, F. — Endroits marécageux, bords des rivières, etc.; sous les pierres, les herbes, les morceaux de bois (r). La var. *melanocornis*, Déj., se trouve aussi dans les mêmes endroits et conditions. (Ay, Muizon, Aussonce). (Abbé Hénon).

Holosericeus, F. — Trouvé à deux reprises, en avril, près du château des Maretz, en secouant des herbes arrachées au pied des arbres.

Sulcicollis, Payk. — Un seul exemplaire, trouvé en mai, dans les marais de Muizon. (Charbonneau).

OODES. — Bonelli.

Helopioides, F. — Dans les marais, en secouant les herbes au printemps et à l'automne (c). (Muizon, Thuisy.)

LICINUS. — Latreille.

Silphoïdes, F. — Dans les endroits arides, sous les pierres, les mottes de terre, etc. (rr). (Saint-Souplet, Reims : Dieu-Lumière.)

Cassideus, F. — Comme le précédent (r). (Reims, Rilly, Merfy.)

Depressus, Payk. — Dans les bois, sous la mousse au pied des arbres (rr). (Trigny, Rilly.)

Digitized by Google

BADISTER — Clairville.

Unipustulatus, Bon. — Trouvé une seule fois sous la mousse en décembre, dans les bois de Merfy.

Bipustulatus, F. — Dans les bois, sous les mousses, les feuilles sèches, etc. (cc), +.

Peltatus, Panz. — Endroits marécageux, sous des détritus végétaux (r). (Muizon, Thuisy.)

Humeralis, Bon. — Au pied des arbres, le long de la Vesle (Cormontreuil) ; sous les herbes sèches, dans les marais (Sillery.)

STOMIDAE

BROSCUS. — Panzer.

Cephalotes, L. — L'été dans les grévières, autour de Reims ; sous les pierres, dans les endroits sablonneux (c). (Châlons-sur-Vesle.)

STOMIS. — Clairville.

Pumicatus, Panz. — Dans les marais, sous les tas d'herbes sèches (c), (Muizon, Thuisy) ; dans des détritus d'inondation (Ay), en avril et en mai.

HARPALIDAE

ACINOPUS. — Dejean.

Tenebrioides, Duft. — Dans les endroits arides, sous les pierres (c). (Berru, camp de Châlons, lieudit : Monte-à-Pied, près Cernay.)

Digitized by Google

DIACHROMUS. — Erichson.

Germanus, L. — Sur des graminées (Thuisy) ; sur des souches de bois de chêne (forêt de Germaine), (R).

ANISODACTYLUS. — Dejean.

Signatus, Panz. — Au bord de la Marne, dans des détritus d'inondation. (Béthune), (RR).

Binotatus, F. — Sous les pierres et divers abris dans les endroits humides (R). (Germaine, Ay.)

BRADYCELLUS. — Erichson.

Harpalinus, Dej. — Dans les bois humides, sous les mousses, les feuilles mortes, etc. (C). (Germaine, Rilly.)

OPHONUS. — Stephens.

Sabulicola, Panz. — Dans les bois, sous les pierres (R). (Germaine.)

Azureus, F. — Sous les pierres, les détritus, etc. (C), +.

Rupicola, Sturm. — Comme le précédent (R). (Germaine.)

Puncticollis, Payk. — Dans les bois, sous les pierres et quelquefois sur les ombellifères (RR). (Germaine, Rilly.)

Signaticornis, Duft. — Sous les pierres (RR). (Germaine).

Maculicornis, Duft. — Sous des pierres, au pied d'une haie, le long du chemin de fer des Ardennes (RRR).

Ruficornis, F. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres ; dans les champs, sous les pierres, les javelles, etc. (CC), +.

Griseus, Panz. — Comme le précédent (C), +.

Calceatus, Duft. — Endroits sablonneux, sous les pierres (RRR). (Reims.) (Warnier).

Digitized by Google

HARPALUS. — Latreille.

Aeneus, F. — Se trouve un peu partout, jusque sur les trottoirs dans les rues (ccc), +.

Distinguendus, Duft. — Sous les pierres et divers abris (cc), +.

Rubripes, Duft. — Indiqué comme trouvé dans la Marne par M. de Saint-Marceaux, ?.

Latus, L. — Sous les pierres et les mousses, dans les bois (rr). (Germaine.)

Caspius, Stev. — Dans les champs, sous les pierres (c), +.

Hottentota, Duft. — Dans les bois humides, sous les pierres, les mousses, etc. (r). (Berru, Rilly.)

Tardus, Panz. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres, au printemps (cc). (Châlons-sur-Vesle.)

Serripes, Quens. — Lieux arides, sous les pierres (rr). (Germaine). (Abbé Lelong).

Servus, Duft. — Cité comme ayant été trouvé par M. de Saint-Marceaux, ?.

Anxius, Duft. — Endroits sablonneux, sous les pierres (c). (Merfy, Chenay.)

Picipennis, Duft. — Dans les herbes au pied des arbres, dans les champs, sous les pierres, les mottes de terre, etc. (r), !.

STENOLOPHUS. — Dejean.

Teutonus, Schr. — Dans les endroits humides, sous la mousse, les feuilles, etc. (c). (Ay, Germaine, Trigny.)

Digitized by Google

ACUPALPUS. — Latreille.

Meridianus, L. — Endroits humides, sous les mousses, les herbes, etc. (ccc), +.

Flavicollis, Sturm. — Sous la mousse, au bord des ruisseaux, dans les bois (r), (Germaine, Rilly); aussi dans les marais, sous les herbes sèches (Thuisy.)

Exiguus, Dej. — Trouvé dans les marais le long de la Vesle, derrière la porte de Fléchambault (loc. détr.) (r); dans les détritus d'inondation (Ay.)

FERONIDAE

FERONIA. — Latreille.

S. g. *Sogines.* (Leach).

Punctulata, Schal. — Trouvée plusieurs fois dans un chemin sablonneux, près Châlons-sur-Vesle, et dans les bois de Merfy sous la mousse (rr).

S. g. *Poecilus.* (Bonelli).

Cuprea, L. — Se trouve partout, dans les champs courant à terre, ou sous les pierres, les herbes, etc. (ccc), +.

Versicolor, Sturm. — Terrains calcaires, sous divers abris (rr), !.

Dimidiata, Ol. — Dans les mêmes conditions que *F. cuprea* (cc), +.

Koyi, Germ. — Dans les champs et les clairières des bois, sous les pierres (c). (Berru, camp de Châlons.)

Lepida, F. — Dans les bois sablonneux (r). (Merfy, Châlons-sur-Vesle.)

S. g. *Adelosia.* (Stephens).

Digitized by Google

Picimana, Duft. — Dans les marais longeant la Vesle (rr). (Reims : Fléchambault), loc. dét.
S. g. *Lagarus*. (Chaudoir).

Vernalis, Panz. — Dans les marais, et au bord des rivières sous des détritus végétaux (cc). (Thuisy, Ay.)
S. g. *Lyperus*. (Chaudoir).

Aterrima, Dej. — Dans les marais, enfoncée dans la vase parmi les racines des roseaux ou sous des pierres enfoncées profondément en terre (rr). (Thuisy.)
S. g. *Omaseus*. (Stephens).

Melanaria, Illig. — Dans les bois et les champs sous les pierres (cc), +.

Nigrita, F. — Sous les herbes au pied des arbres dans les endroits humides; dans les marais sous les herbes et les détritus (c). (Thuisy.)

Anthracina, Illig. — Comme la précédente (c). (Ay, Muizon, Thuisy.)

Gracilis, Dej. — Sous les herbes dans les marais, et au pied des arbres dans les endroits humides (rr). (Thuisy, Reims : Fléchambault), loc. dét.

Minor, Gyll. — Endroits marécageux, sous des détritus végétaux (c). (Muizon, Thuisy.)
S. g. *Argutor*. (Dejean).

Interstincta, Sturm. — Dans les bois humides, sous les mousses et les pierres (rr). (Germaine.)

Strenua, Panz. — Endroits humides, sous les feuilles, les mousses, les pierres, etc. (rr). (Thuisy, Cormontreuil.)

Diligens, Sturm. — Dans les champs autour de Reims et aussi dans les marais (rr). (Thuisy.)
S. g. *Platysma*. (Bonelli).

Digitized by Google

Oblongopunctata, F. — Dans les bois, sous les pierres, les feuilles mortes, etc. (c). (Germaine, Rilly, Merfy.)
S. g. *Steropus*. (Stephens).

Madida, F. — Comme la précédente (r). (Germaine.)
S. g. *Pterostichus*. (Bonelli).

Parumpunctata, Germ. — Sous les pierres dans les bois (rr). (Germaine.)
S. g. *Abax*. (Bonelli).

Striola, F. — Sous la mousse dans les bois, dans les champs sous les pierres et divers abris (cc), +.

Ovalis, Duft. — Dans les bois, sous la mousse, les feuilles sèches, les pierres, etc. (c). (Rilly, Germaine, Verzy.)

Parallela, Duft. — Comme la précédente (c). (Germaine.)
S. g. *Molops*. (Bonelli).

Terricola, F. — Dans les bois, sous les mousses, les feuilles, etc. (cc). (Germaine, Rilly.)

ZABRUS. — Clairville.

Curtus, Dej. — Indiqué comme trouvé par M. de Saint-Marceaux, ?.

Gibbus, Clairv. — Sous les pierres, dans les champs, les grévières, les sablonnières, etc. (cc), +.

AMARA. — Bonelli.

S. g. *Triaena*. (Le Conte).

Striatopunctata, Dej. — Dans les endroits humides, quelquefois sur les graminées (rr). (Monthermé (Ardennes.)

Digitized by Google

Tricuspidata, Dej. — Sur les graminées (rr). (Laifour (Ardennes.)

S. g. *Amara*. — Bonelli.

Similata, Gyl. — Endroits humides sous les pierres ; quelquefois courant à terre (rr), !.

Ovata, F. — Sous les détritus d'inondation, au bord des rivières (c). (Ay.)

Montivaga, Sturm. — Comme la précédente (r). (Ay.)

Communis, Panz. — Endroits humides sous les détritus végétaux (rr), !.

Curta, Dej. — Dans les détritus, sous les pierres (rr), !.

Acuminata, Payk. — Endroits sablonneux, sous les mousses, les pierres, etc. (r). (Germaine, Merfy.)

Trivialis, Gyll. — Sous les détritus et divers abris, courant à terre sur les chemins et jusque dans les rues (ccc), +.

Spreta, Dej. — Dans les grévières autour de Reims (rr).

Familiaris, Duft. — Dans les détritus végétaux au bord des rivières (r). (Ay.)

Lucida, Duft. — Comme la précédente, et aussi dans les endroits sablonneux (r). (Ay, Aussonce). (Abbé Hénon).

Anthobia, Villa. — Sous des détritus d'inondation (rr). (Ay.)

S. g. *Celia*. (Zimmermann).

Bifrons, Gyll. — Endroits sablonneux, sous les pierres (rr). (Merfy.)

S. g. *Cyrtonotus*. (Stephens).

Digitized by Google

Aulica, PANZ. — Dans les grévières autour de Reims; dans les champs, sous les pierres (RR). (Germaine.)

S. g. *Bradytus*. (STEPHENS).

Fulva, DE GEER. — Terrains sablonneux, sous les pierres (CC). (Châlons-sur-Vesle, Merfy.)

Consularis, DUFT. — Endroits sablonneux; grévières, etc. (R)!

Apricaria, PAYK. — Dans les grévières près de la porte de Fléchambault, sous les pierres (R).

ANCHOMENIDAE

SPHODRUS. — DEJEAN.

Leucophthalmus, L. — Dans les caves, les celliers humides, l'été (RR), +.

S. g. *Pristonychus*. (DEJEAN).

Terricola, HERBST. — Dans les caves, les celliers, les grévières; sous les planches, les lattes, ayant séjourné quelque temps au même endroit. M. Demaison l'a trouvé en nombre dans des tas de tubercules de dahlias, déposés pendant l'hiver précédent dans une cave (C), +.

CALATHUS. — BONELLI.

Cisteloides, PANZ. — Dans les champs, les terrains vagues, sous les pierres, les mottes de terre, les berbes (CC), +.

Gallicus, FAIRM. — Dans les bois, sous les pierres, les feuilles mortes, etc. (R), +.

Digitized by Google

Fulvipes, Gyll. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres (r). (Merfy, Châlons-sur-Vesle, Chenay.)

Fuscus, F. — Dans les champs, sous les pierres, les gerbes, etc. (c), +.

Melanocephalus, L. — Dans les champs, les terrains vagues, sous les pierres, les gerbes, etc. (ccc), +.

TAPHRIA. — Dejean.

Nivalis, Panz. — Dans les bois, sous les mousses, au pied des arbres, dans les marais en secouant les herbes sèches (rr). (Thuisy.)

ANCHOMENUS. — Bonelli.

Angusticollis, F. — Dans les endroits humides, sous les mousses, sous les écorces d'arbres abattus (c). (Germaine, Muizon.)

Livens, Gyll. — Dans les endroits humides, sous les pierres et les herbes (rrr). (Courcelles.)

Prasinus, Thunb. — Sous les herbes, au pied des arbres; sous les pierres, les gerbes, etc. (ccc), +.

Albipes, F. — Dans les endroits humides, sous les pierres, les feuilles sèches, les herbes, etc. (cc). (Ay, Muizon.)

Oblongus, E. — Comme le précédent (r). (Ay.)
S. g. *Agonum*. (Bonelli).

Marginatus, L. — Au bord des eaux, sous les pierres, les détritus végétaux, etc. (r). (Ay.)

Digitized by Google

Sexpunctatus, L. — Dans les endroits marécageux des bois, sous les pierres, les mousses, les herbes, etc. (c). (Germaine, Rilly.)

Parumpunctatus, F. — Dans les mêmes conditions que le précédent (c). (Germaine, Rilly); au bord des rivières sous des détritus végétaux. (Ay.)

Lugens, DUFT. — Dans les marais sous les herbes sèches, les roseaux, etc. (c). (Thuisy, Muizon.)

Viduus, PANZ. — Dans les endroits marécageux, sous les détritus végétaux (c). (Thuisy, Sillery, Courcelles.) La var. *moestus* DUFT., se trouve dans les mêmes conditions que le type (cc).

Micans, NICOL. — Sous les herbes, les écorces, au bord des rivières et dans les endroits marécageux (RR). (Ay, Muizon, Courcelles.)

Piceus, L. — Dans les marais, en secouant des herbes sèches (RR). (Thuisy.)

Fuliginosus, PANZ. — Dans les mêmes conditions que le précédent (c). (Thuisy, Jonchery, Muizon.)

Thoreyi, DEJ. — Comme les précédents (R). (Thuisy.)

OLISTHOPUS. — DEJEAN.

Rotundatus, PAYK. — Sous les feuilles sèches, au pied des arbres, dans les endroits sablonneux (R). (Germaine, Reims : Fléchambault.)

TRECHIDAE

TRECHUS. — CLAIRVILLE.

Minutus, F. — Se trouve surtout dans les bois, sous les mousses, les fagots, etc. (ccc), +.

Digitized by Google

BEMBIDIDAE

TACHYPUS. — Castelnau.

Flavipes, L. — Sous les pierres au bord des eaux (c). (Ay.)

BEMBIDIUM. — Latreille.

S. g. *Bracteon*. (Bedel).

Argenteolum, Ahr. — Au bord des rivières et des mares (rr). (Reims). (Fairmaire et Laboulbène).

S. g. *Notaphus*. (Stephens).

Punctulatum, Drap. — Dans les graviers au bord des cours d'eau (r). (Ay.)

Varium, Ol. — Dans les détritus végétaux au bord des eaux (cc), +.

Flammulatum, Clairv. — Dans les mêmes conditions que le précédent (c), +.

Assimile, Gyll. — Au bord des rivières, des mares, dans les marais, sous les herbes et les détritus (r). (Ay, Thuisy.)

S. g. *Bembidium*. (Latreille).

Lampros, Herbst. — Dans les endroits humides, sous les mousses, les feuilles sèches, les détritus (cc), +.

Pusillum, Gyll. — Sous les pierres et les détritus végétaux, au bord des eaux (c). (Ay.)

Tenellum, Er. — Comme le précédent (rr) !

Digitized by Google

Sturmi, PANZ. — Au bord des cours d'eau et des mares (RR). (Ay.)

Doris, PANZ. — Au bord des eaux courantes ou stagnantes, sous les détritus, dans les graviers, etc. (R). (Saint-Imoges, Thuisy, Ay.)

Articulatum, PANZ. — Au bord des eaux, sous les pierres, les détritus, etc. (C), +.

Quadrimaculatum, L. — Comme les précédents (C). (Ay, Berru, Thuisy.)

Quadripustulatum, DEJ. — Dans les détritus d'inondation, au bord des rivières (RR). (Ay.)

Callosum, KUST. — Dans les détritus d'inondation, dans les marais, au bord des mares (RR). (Ay, Muizon.)

Quadriguttatum, F. — Au bord des eaux courantes ou stagnantes, sous des détritus végétaux (C). (Thuisy, Courcelles.)

S. g. *Peryphus*. (STEPHENS).

Nitidulum, MARSH. — De préférence dans les endroits sablonneux, sous les mousses humides, les feuilles, etc. Aussi au bord des eaux, dans les détritus (R). (Ay, Rilly.)

Fluviatile, DEJ. — Dans les graviers, au bord des rivières (RR). (Ay, en Avril, Mai et Juin.)

Femoratum, SHERM. — Dans les mêmes conditions que le précédent (C). (Ay.)

Ustulatum, L. — Au bord des eaux et dans les endroits humides, dans les graviers, sous les pierres, les détritus, etc. (CC), +.

Digitized by Google

Decorum, Panz. — Sous les pierres et les détritus au bord des rivières et des mares (r). (Ay, Châlons-sur-Marne.)

S. g. *Philochtus*. (Stephens).

Obtusum, Sturm. — Au bord des mares et des cours d'eau, sous les détritus végétaux (c). (Muizon, Ay, Courcelles.)

Guttula, F. — Endroits humides, sous des détritus végétaux (rr). (Reims) (Warnier).

Biguttatum, F. — Comme le précédent (c) !

S. g. *Ocys*. (Stephens).

Quinquestriatum, Gyll. — Sous les mousses, les feuilles sèches, les écorces, etc. (rr) !

Rufescens, Guer. — Trouvé à Soudron (Bouché) ? (rr).

TACHYS. — Stephens.

Nana, Gyll. — Sous les écorces de sapins abattus (c). (Thuisy, Merfy.)

Bistriata, Duft. — Endroits humides sous les mousses, les pierres, etc. (c). (Thuisy, Germaine.)

Digitized by Google

HYDROCANTHARES

DYTISCIDAE

CYBISTER. — Curtis.

Roeseli, F. — Au printemps, dans les eaux courantes et stagnantes (R). (Muizon, Bezannes.)

DYTISCUS. — Linné.

Latissimus, L. — Dans les étangs et grandes mares, quelquefois dans les eaux courantes (RR). (Etang de Saint-Imoges) (H. Paris). (Cormontreuil, marais de Muizon.)

Circumcinctus, Ahr. — Dans les mares (RRR). (Thuisy.) (Warnier).

Marginalis, L. — Dans les mares, les étangs, les cours d'eau parmi les plantes aquatiques (CC). (Muizon, Taissy, Thuisy, Cormontreuil). On trouve aussi la var. ♀ *conformis*, Hunze, (RR). (Berru.)

Circumflexus, F. — Dans les eaux stagnantes (R). (Berru, Muizon, Courcelles.)

Dimidiatus, Bergst. — Dans les eaux courantes et stagnantes (RR), (Epernay, Châlons-sur-Marne.)

Digitized by Google

Punctulatus, F. — Comme le précédent (CC). (Taissy, Courcelles, Muizon, Thuisy.)

ACILIUS. — LEACH.

Sulcatus, L. — Dans les eaux stagnantes (C). (Thuisy, Muizon, Bezannes.)

Canaliculatus, NICOL. — Comme le précédent (RR). (Muizon, Saint-Brice, Thuisy.)

HYDATICUS. — LEACH.

Transversalis, F. — Dans les mares et les étangs (R). (Muizon, Thuisy, Reims : Porte Paris.)

Hybneri, F. — Dans les eaux stagnantes (C). (Muizon, Thuisy, Berru.)

Cinereus, L. — Dans les mares (RR). (Cernay.)

Zonatus, HOPPE. — Comme les précédents (RR). (Cernay, Berru), (loc. dét.).

COLYMBETIDAE

COLYMBETES. — CLAIRVILLE.

Fuscus, L. — Dans les eaux stagnantes (CCC), +.

RHANTUS. — LACORDAIRE.

Grappei, GYLL. — Dans les marais (RR), (Muizon.)

Pulverosus, STEPH. — Dans les fossés et les mares (C). (Cernay, Berru, (loc. dét.), Courcelles.)

Bistriatus, BERGST. — Dans les mares (RR). (Berru.)

Collaris, PAYK. — Comme le précédent, surtout au printemps (CC). (Cernay, Courcelles.)

Digitized by Google

Adspersus, F. — Dans les eaux stagnantes (RR). (Berru, (loc. dét.), Cernay.)

ILYBIUS. — ERICHSON.

Ater, DE GEER. — Eaux courantes et stagnantes (RR). Trouvé une fois sous les mousses dans les bois de Merfy (WARNIER).

Obscurus, MARSH. — Etangs, mares et fossés (RR). (Cernay, Saint-Imoges.)

Fuliginosus, F. — Comme le précédent (R). (Reims : fossés près de la Porte Paris.)

Fenestratus, F. — Comme les précédents (R) !

COPELATUS. — ERICHSON.

Agilis, F. — Dans les eaux stagnantes (R). (Cernay, Reims : Porte de Paris.)

AGABUS. — LEACH.

Biguttatus, OL. — Etangs de Saint-Imoges (R).

Paludosus, F. — Eaux courantes (RR). (Cormontreuil, dans la Vesle.)

Uliginosus, L. — Eaux stagnantes dans les bois (RR). (Germaine.)

Didymus, OL. — Dans les eaux courantes et stagnantes (CC), +.

Nebulosus, FORST. — Au Printemps dans les eaux stagnantes (R). (Berru), (loc. dét.)

Femoralis, PAYK. — Dans les mares et les fossés (C). (Berru, Cernay.)

Abbreviatus, F. — Dans les fossés formés par la Vesle près de la Porte Paris (C).

Digitized by Google

Sturmi, Gyl. — Dans les eaux courantes ou stagnantes, l'été surtout (c). (Cernay, Muizon.)

Neglectus, Er. — Dans les mares et fossés dans les bois (rr). (Germaine.)

Bipustalatus, L. — Dans les eaux courantes ou stagnantes (ccc), +. On a trouvé aussi la var. *Solieri*, A. (Bellevoye-Delsuc.)

PLATAMBUS. — Thomson.

Maculatus, L. — Dans les eaux courantes (cc). (Taissy, Muizon.)

NOTERUS. — Clairville.

Crassicornis, Müll. — Dans les eaux stagnantes (cc), +.

Sparsus, Marsh. — Comme le précédent (cc), +.

LACCOPHILUS. — Leach.

Hyalinus, de Geer. — Dans les eaux courantes (c). (Taissy, Cormontreuil, Muizon.)

Obscurus, Panz. — Dans les eaux stagnantes (c). (Germaine, Courcelles.)

Variegatus, Germ. — Dans les eaux stagnantes (rr). (Thuisy.)

HYDROPORIDAE

HYPHYDRUS. — Illiger.

Ferrigineus, L. — Dans les mares et les fossés parmi les plantes aquatiques (cc), +.

Digitized by Google

BIDESSUS. — Sharp.

Bicarinatus, Clairv. — Etangs et grandes mares (rr). (Saint-Imoges, Thuisy.)

Unistriatus, Schr. — L'été dans les marais, les mares, les fossés (c). (Thuisy, Cernay, Taissy, Saint-Brice.)

Geminus, F. — Comme le précédent (c). (Taissy, Courcelles, Muizon.)

COELAMBUS. — Thomson.

Inaequalis, F. — Pendant l'été, dans les eaux stagnantes (r). (Ay, Muizon, Courcelles.)

Versicolor, Schal. — Dans les marais (r). (Courcelles.)

Picipes, F. — Dans les mares (rr). (Cernay, Courcelles.)

Confluens, F. — Dans les mares des bois (rr). (Germaine.)

Decoratus, Gyll. — Dans les petites mares (rrr). (Muizon.)

DERONECTES. — Sharp.

Latus, Gyll. — Dans les cours d'eau, généralement sous les graviers (rrr); dans le ruisseau de Prosne. (Thuisy.) (Bellevoye.)

Duodecimpustulatus, F. — Dans les eaux courantes et les fossés alimentés par les cours d'eau (r). (Taissy.)

Depressus, F. — Parmi les herbes aquatiques dans les eaux courantes, et les fossés d'eau vive (cc), +.

Canaliculatus, Lacd. — Dans les eaux courantes (rr). (Taissy.)

Digitized by Google

HYDROPORUS. — Clairville.

Lineatus, E. — Dans les eaux stagnantes (c), +.

Granularis, L. — Comme le précédent (cc), +.

Flavipes, Ol. — Comme les précédents (c), +.

Pictus, F. — Dans les eaux courantes ou dormantes (cc), +.

Melanarius, Sturm. — Dans les fossés formés par la Vesle près de la Porte de Paris (rr).

Memnonius, Nicol. — Dans les ruiseaux et les mares dans les bois (r). (Germaine.)

Nigrita, F. — Dans les eaux courantes; de préférence dans les endroits ombragés (rr). (Taissy.)

Discretus, Fairm. — Dans les mares des bois (rr). (Germaine.)

Pubescens, Gyll. — Dans les eaux stagnantes (r). (Germaine, Cernay.)

Planus, F. — Comme le précédent (cc), +.

Piceus, Steph. — Comme les précédents (r). (Thuisy.)

Tristis, Payk. — Dans les mares des bois (r). (Cernay, Germaine.)

Angustatus, Sturm. — Dans les eaux stagnantes (r). (Courcelles.)

Vittula, Er. — Comme le précédent (r). (Berru.)

Palustris, L. — Comme les précédents (cc). (Courcelles, Thuisy, Muizon.)

Erythrocephalus, L. — Dans les marais de Courcelles (r).

Rufifrons, Duft. — Comme le précédent (r).

Dorsalis, F. — Dans les mares, les fossés, etc. (r). (Muizon, Cernay.)

Digitized by Google

PELOBIDAE

PELOBIUS. — Schönherr.

Hermanni, F. — Dans la vase au fond des mares ou dans les boues provenant du curage des fossés bourbeux (R). (Cernay.)

HALIPLIDAE

HALIPLUS. — Latreille.

Confinis, Steph. — Parmi les herbes aquatiques dans les mares (RR). (Taissy.)

Varius, Nicol. — Dans les eaux dormantes (RR). (Taissy.)

Amoenus, Ol. — Comme *H. Confinis* (RR). (Germaine, Taissy.)

Fulvus, F. — Dans les eaux stagnantes (R). (Muizon, Thuisy, Taissy.)

Variegatus, Sturm. — Dans les mares d'eau limpide; parmi les herbes (R). (Cernay, Courcelles.)

Flavicollis, Sturm. — Dans les eaux courantes ou stagnantes (C), +.

Ruficollis, de Geer. — Dans les fossés et les mares (CC), +.

Fluviatilis, A. — Dans les cours d'eau, parmi les herbes (R). (Taissy.)

Lineatocollis, Marsh. — Dans les cours d'eau, les mares, les fossés, parmi les herbes (CC), +.

Digitized by Google

CNEMIDOTUS. — Erichson.

Cœsus, Duft. — Dans les mares et les étangs (c), +.

Rotundatus, A. — Dans les eaux stagnantes ou courantes (rr), +.

GYRINIDAE

GYRINUS. — Geoffroy.

Natator, L. — En groupe, sur toutes les eaux, dès le premier printemps (ccc), +.

Marinus, Gyll. — Comme le précédent (cc), +.

Bicolor, F. — A la surface des étangs et des mares, pendant l'été. Se trouve isolément et non par groupes (rr). (Muizon.)

Minutus, F. — Se trouve ordinairement, mais en petit nombre, parmi les troupes de *G. natator* et *G. marinus* (tr). (Muizon, Sillery, Taissy.)

Urinator, Illig. — Dans les eaux courantes, ordinairement isolé (rr). (Fismes.)

Concinnus, Klug. — Par groupes assez nombreux, quelquefois mélangés avec les troupes d'autres genres (cc). (Taissy, Sillery.)

Villosus, Illig. — Après les bois immergés ou flottants; quelquefois sous les pierres ou fond de l'eau (r). (Muizon, Jonchery, Taissy.)

Digitized by Google

PALPICORNES

HYDROPHILIDAE

HYDROPHILUS. — Geoffroy.

Piceus, L. — Dans les mares, les fossés, etc., parmi les plantes aquatiques (c), +.

HYDROUS. — Brullé.

Caraboïdes, L. — Eaux courantes ou stagnantes, parmi les herbes (c), +.

HYDROBIUS. — Leach.

Oblongus, Herbst. — Dans les eaux stagnantes (rr). (Cernay.)

Fuscipes, L. — Dans les mares, les fossés; quelquefois parmi les herbes humides au bord des eaux (cc). (Germaine, Cernay, Thuisy, Muizon.)

Nigroaeneus, Sahl. — Dans les eaux dormantes (rr). (Taissy, Germaine.)

Digitized by Google

ANACAENA. — Thomson.

Globulus, Payk. — Dans des détritus végétaux au bord des eaux (rr). (Germaine, Thuisy.)

Limbata, F. — Dans les eaux dormantes (rr). (Courcelles, Thuisy.)

Bipustulata, Marsh. - Dans les cours d'eau et les mares (rr). (Courcelles.)

PHILHYDRUS. — Solier.

Testaceus, F. — Dans les eaux stagnantes (r). (Thuisy, Reims : Porte de Paris.)

Frontalis, Er. — Dans les mares des bois (r). (Germaine.)

Minutus, F. — Dans les eaux stagnantes (c). +.

Coarctatus, Gredl. — Comme le précédent (rr) !

Marginellus, F. — Comme les précédents (c), +. (Rilly, Thuisy, Courcelles.)

HELOCHARES. — Mulsant.

Lividus, Forst. — Dans les eaux dormantes (c). (Thuisy, Ay, Reims : Porte de Paris.)

LACCOBIUS. — Erichson.

Sinuatus, Mots. — Dans les eaux vives ou dormantes (r). (Courcelles, Thuisy.)

Alutaceus, Thoms. — Comme le précédent (r). (Rilly.)

Minutus, L. — Comme les précédents (r), +.

Digitized by Google

BEROSUS. — Leach.

Signaticollis, Charp. — Dans les étangs et les mares herbeuses (c). (Berru, (loc. dét.), (Germaine.)

Luridus, L. — Dans les eaux stagnantes (r). (Courcelles.)

Affinis, Brul. — Comme le précédent (r). (Thuizy, Muizon.)

LIMNEBIUS. — Leach.

Papposus, Muls. — Dans les mares et les fossés herbeux (r). (Cernay, Berru (loc. dét.), Sillery.)

CYLLIDIUM. — Erichson.

Seminulum, Herbst. — Dans les détritus végétaux, au bord des eaux (c). (Thuisy, Muizon.)

HELOPHORIDAE

HELOPHORUS. — Fabricius.

Rugosus, Ol. — Dans la vase d'un fossé desséché (rr). (Cernay.)

Nubilus, F. — Dans la terre humide au bord des eaux (r). (Berru.)

Aquaticus, L. — Sous les détritus végétaux encore humides ou dans les eaux stagnantes (cc). (Cernay, Thuisy, Muizon.)

Frigidus, Graels. — Dans les eaux stagnantes (r). (Germaine, Courcelles.) !

Aeneipennis, Thoms. — Dans les eaux stagnantes (cc). (Ay, Germaine, Thuisy.)

Digitized by Google

Granularis, L. — Comme le précédent (C.). (Germaine, Cernay.)

Erichsoni, BACH. — Comme les précédents (R). (Berru, Germaine.)

Brevipalpis, BED. — Comme les précédents (C). (Rilly, Thuisy, Muizon.)

HYDROCHUS. — LEACH.

Angustatus, GERM. — Parmi les herbes des étangs et grandes mares (C). (Saint-Imoges, Germaine.)

Elongatus, SCHAL. — Dans les prés et les mares (R). (Sillery, Cormontreuil.)

Carinatus, GERM. — Comme le précédent (R). (Courcelles, Saint-Imoges, Châlons-sur-Marne.)

Brevis, HERBST. — En tamisant des détritus végétaux au bord des étangs et mares (RR). (Saint-Imoges.)

OCHTEBIUS. — LEACH.

Pygmaeus, F. — Dans les eaux stagnantes (C). (Ay. Courcelles, Cormontreuil.)

Exsculptus, GERM. — Dans les eaux vives (R). (Germaine.)

HYDRAENA. — KUGELANN.

Testacea, CURTIS. — Dans les eaux stagnantes (R). (Sillery, Courcelles.)

Nigrita, GERM. — Dans les eaux courantes (R). (Taissy, Cormontreuil.)

Digitized by Google

Riparia, KUGEL. — Dans les mares et les cours d'eau sous les pierres; quelquefois, en fauchant au printemps, les herbes au-dessus des mares (C). (Saint-Imoges, Sillery, Muizon.)

SPHAERIDIDAE

CYCLONOTUM. — ERICHSON.

Orbiculare, F. — En tamisant des détritus végétaux au bord des eaux (CC). (Thuisy, Muizon, Courcelles.)

SPHAERIDIUM.

Scarabaeoïdes, L. — Dans les bouses de vaches (C). (Germaine, Merfy.)

CERCYON. — LEACH.

Haemorrhoïdalis, F. — Dans les excréments des herbivores (C), +.

Obsoletus, GYLL. — Dans les bouses, les cadavres, etc. (RR). (Germaine.)

Melanocephalus, L. — Dans les fumiers et les crottins de moutons (R) !

Lateralis, MARSH. — Dans les matières en décomposition (R). (Germaine, Trigny.)

Aquaticus, STEPH. — Dans les détritus végétaux au bord des eaux (RR). (Thuisy.)

Unipunctatus, L. — Dans les fumiers; au vol le soir (C), +.

Digitized by Google

Lugubris, Payk. — Dans les endroits marécageux, sous les détritus végétaux (rr). (Muizon.)

Quisquilius, L. — Dans les déjections animales, de préférence dans les endroits sablonneux (c). (Ay, Merfy.)

Nigriceps, Marsh. — Dans les déjections animales, les cadavres, etc. (r) !

Pygmaeus, Illig. — Dans les bouses, les fumiers, etc.; le soir au vol (r). (Germaine, Muizon, Thuisy.)

Analis, Payk. — Dans les détritus végétaux, au bord des eaux (c). (Thuisy, Muizon.)

MEGASTERNUM. — Mulsant.

Boletophagum, Marsh. — Dans les fumiers, les bolets, etc. (Thuisy, Germaine.)

CRYPTOPLEURUM. — Mulsant.

Atomarium, F. — Dans les matières en décomposition (cc), +.

Digitized by Google

BRACHÉLYTRES

ALEOCHARIDAE

AUTALIA. — Stephens.

Impressa, Ol. — Dans les bois, en tamisant des champignons en décomposition, à l'automne (cc). (Cernay, Rilly.)

FALAGRIA. — Stephens.

Sulcata, Payk. — Dans les champs, sous les détritus végétaux (r) !

Sulcaluta, Grav. — En tamisant des herbes sèches dans les endroits marécageux (r). (Cormontreuil, Muizon.)

Obscura, Grav. — Dans les champs, sous divers abris; le soir au vol (cc), +.

BOLITOCHARA. — Mannerheim.

Lucida, Grav. — Dans les champignons dans les bois (rr). (Berru.)

Flavicollis, Muls. — Comme le précédent (rr). (Germaine.) (?)

Digitized by Google

Lunulata, Payk. — Dans les bolets et divers champignons des bois (R). (Germaine.)

SILUSA. — Erichson.

Rubiginosa, Er. — Sous les écorces et dans les plaies des arbres (R). (Saint-Brice, Rilly.)

Rubra, Er. — Dans les champignons dans les bois (RR). (Berru.)

LEPTUSA. — Fairmaire.

Ruficollis, Er. — Sous les mousses, les herbes, dans les vieux fagots (R) !

THIASOPHILA. — Kraatz.

Angulata, Er. — Dans les nids de *Formica rufa* (C). (Châlons-sur-Vesle, Cernay.)

HOMOEUSA. — Kraatz.

Acumimata, Maerk. — Dans la carie des vieux arbres, en compagnie de *Formica fuliginosa;* dans les endroits marécageux (RR) ! (Bellevoye).

MICROGLOSSA. — Kraatz.

Gentilis, Lux. — Dans les endroits envahis par *Formica fuliginosa* (R). (Chigny, Cernay, Germaine.)

ALEOCHARA. — Gravenhorst.

Fuscipes, E. — Dans les matières organiques en décomposition (CC), +.

Bipunctata, Ol. — Comme le précédent (R). (Muizon.)

Digitized by Google

Tristis, Grav. — Comme les précédents (r). (Germaine.)

Lanuginosa, Grav. — Dans les cadavres, les bouses, les fumiers, etc. (c), +.

Mycetophaga, Kr. — Dans les champignons en décomposition (r). (Berru, Cernay, Chigny, Germaine.)

Moesta, Grav. — Cette espèce, capturée dans les Ardennes, par M. Warnier, doit se rencontrer dans notre région; elle se trouve dans divers détritus.

Latipalpis, Muls. — Dans les mousses et les divers champignons (rr) !

Nitida, Grav. — Dans les bouses et les matières organiques en décomposition (cc), +.

DINARDA. — Mannerheim.

Dentata, Grav. — Sous les pierres en compagnie de *Formica rufa* (rr). (Germaine.)

LOMECHUSA. — Gravenhorst.

Strumosa, Grav. — Comme le précédent (r). (Germaine.)

Paradoxa, Steph. — Pendant l'été, sous les pierres, avec *Lasius niger*, *Myrmica rubra*, *Formica fuliginosa* (rr), +.

MYRMEDONIA. — Erichson

Fulgida, Grav. — M. Bellevoye a reçu quatre exemplaires de cette espèce, trouvés à Rethel. Cette espèce est méridionale et rare partout. Un exemplaire a cependant été trouvé à Dijon.

Collaris, Payk. — En tamisant des herbes sèches envahies par les fourmis (r). (Marais de Thuisy.)

Digitized by Google

Limbata, Payk. — Sous des feuilles mortes en compagnie de *Formica flava* (rr). (Ay.)

Humeralis, Grav. — Sous les grosses pierres en compagnie de *Formica rufa* (rr). (Germaine.)

Cognata, Maerk. — En secouant des herbes sèches envahies par *Formica fuliginosa* (rr). (Marais de Thuisy.)

Canaliculata, F. — Sous les pierres, les détritus végétaux, etc. (cc), +.

CALLICERUS. — Gravenhorst.

Rigidicornis, Grav. — Sous les pierres, les herbes, coupées, etc., au bord des cours d'eau (rr). (Ay.)

CALODERA. — Mannerheim.

Nigrita, Manh. — Un seul exemplaire pris à Aussonce (Abbé Hénon).

Riparia, Er. — Au bord des rivières et des mares (rr). (Thuisy.)

TACHYUSA. — Erichson.

Concolor, Er. — Trouvé une seule fois courant sur le sable au bord de la Marne. (Châlons-sur-Marne.)

Coarctata, Er. — Trouvé au bord de la Vesle au moulin de Compensé. (Bellevoye.)

OCYUSA. — Kraatz.

Maura, Er. — Sous des détritus végétaux au bord des eaux (r). +.

Digitized by Google

OXYPODA. — Mannerheim.

Longipes, Muls. — Dans les troncs caverneux des arbres malades, en compagnie de *Formica fuliginosa* (rr) ! (Warnier.)

Lividipennis, Manh. — En tamisant des détritus végétaux dans les endroits marécageux (r). (Thuisy.)

Opaca, Grav. — Sous les mousses, les feuilles mortes, les vieux fagots, etc. (cc), +.

Alternans, Grav. — Dans les champignons, pendant l'automne (cc), +.

Sericea, Heer. — Sous les herbes sèches, les feuilles mortes, etc. (cc), +.

Formiceticola, Maerk. — Dans les nids de *Formica rufa* (cc). (Merfy, Cernay.)

Haemorrhoa, Sahl. — Comme le précédent (ccc). On trouve dans les mêmes conditions la var. *forticornis*. Faiem.

HOMALOTA. — Mannerheim.

Flavipes, Grav. — Dans les nids de *Formica rufa* (r). (Merfy.)

Anceps, Er. — Dans les nids de fourmis surtout avec *Formica rufa* (cc), +.

Sordida, Marsh. — Dans les fumiers, les bouses, etc. (c). (Muizon, Courcelles.)

Aterrima, Grav. — En automne, sous les feuilles mortes, les mousses, etc., dans les endroits boisés (rr). (Germaine.)

Parva, Sahl. — Dans les bouses, les crottins, les agarics, sous les mousses (c), +.

Digitized by Google

Fungi, Er. — Dans les substances végétales en décomposition (c), (Germaine, Cormontreuil, Thuisy.)

Vernacula, Er. — Dans les champignons; sous les mousses et les feuilles mortes (r). (Rilly, Taissy.)

Longicornis, Er. — Sous les fumiers, et dans les détritus végétaux en décomposition (c). (Thuisy, Muizon.)

Divisa, Maerk. — Sous les cadavres, dans les fagots, les plaies d'arbres (rr) !

Sericea, Muls. — Dans les détritus végétaux (r). (Rilly, Courcelles.)

Celata, Heer. — Dans les champignons, les fumiers; aussi avec *Formica rufa* et *Lasius fuliginosus*, (rr) +.

Nigra, Kr. — Dans les bolets et les champignons (rr) !

Sordidula, Er. — Dans les fumiers, les bouses, les crottins (r) !

Marcida, Er. — Dans les bolets et les champignons (rr). (Rilly.)

Ravilla, Er. — Dans les débris végétaux en décomposition (rr). (Muizon, Courcelles.)

Gagatina, Baudi. — Sous les mousses, les feuilles mortes, dans les champignons (c). (Berru, Chigny, Germaine.)

Fungicola, Thoms. — Dans les champignons en décomposition (cc), +.

Oblita, Er. — En automne, dans les champignons, les fruits décomposés, etc. (rr). (Brimont, Rilly.)

Nigritula, Grav. — Dans les champignons décomposés (c), +.

Sericans, Grav. — Sous les mousses, les feuilles sèches, dans les champignons (c). (Germaine, Cernay, Merfy.)

Digitized by Google

Trinotata, Kr. — Dans les champignons, les plaies des vieux arbres, etc. (cc), +.

Triangulum, Kr. — Espèce de la France centrale ou méridionale; trouvée une seule fois à Reims dans des vieux bois de charpente. Cette espèce se rencontre ordinairement sous les détritus végétaux au bord des eaux.

Merdaria, Thoms. — Sous les détritus, dans les excréments, dans les champignons en décomposition (cc), +.

Graminicola, Er. — Dans les détritus végétaux en décomposition (rrr). (Thuisy.)

Hypnorum, Kiesw. — Sous les mousses, les feuilles mortes (rrr). (Guignicourt.)

Umbonata, Er. — Dans les bouses, les vieux fagots, les champignons en décomposition (r). (Berru, Germaine.)

Nitidula, Thoms. — Sous les mousses, les feuilles mortes, dans le voisinage et souvent avec *Formica rufa* et *Lasius fuliginosus* (rr), +.

Aequata, Er. — Sous les écorces de sapin, quelquefois sous les écorces d'autres arbres (rr). (Germaine.)

Angustula, Gyl. — Dans les endroits marécageux sous les détritus végétaux (c), +.

Brunnea, Er. — Sous les mousses, les feuilles mortes, etc. Quelquefois en fauchant sur les fleurs; parfois avec *Lasius fuliginosus* (c). (Bazancourt, Germaine, Rilly.)

Nigriventris, Thoms. — Dans les détritus végétaux; quelquefois en battant les arbres (c). (Brimont, Ay, Germaine.)

Analis, Er. — Dans les herbes sèches, sous les mousses, etc.; parfois avec les fourmis.

Digitized by Google

Talpa, HEER. — Sous les mousses, les herbes sèches; se trouve aussi dans les nids de *Formica rufa* (CC), +.

Exilis, ER. — Dans les nids de *Formica rufa* (R), +.

Elongatula, ER. — Dans les endroits humides, dans les bois, sous les détritus végétaux (RR), +.

Gregaria, ER. — Dans les bois, sous des herbes, ou des mousses humides (R). (Chigny.)

Plana, MANH. — Sous les mousses au pied des arbres (RRR). (Guignicourt, Brimont.)

PLACUSA. — ERICHSON.

Pumilio, GRAV. — Sous les écorces des sapins (RR). (Brimont.)

PHLOEOPORA. — ERICHSON.

Reptans, GRAV. — Comme le précédent (R). (Thuisy.)

Corticalis, ER. — Comme les précédents (C), +.

Producta, MULS. — Sous les écorces des arbres fruitiers (RR), +.

HYGRONOMA. — ERICHSON.

Dimidiata, GRAV. — Dans les endroits marécageux, sous les détritus végétaux (CC), +.

SCHISTOGLOSSA. — KRAATZ.

Viduata, ER. — Comme le précédent (RR). (Sillery.)

Digitized by Google

OLIGOTA. — Mannerheim.

Inflata, Man. — Sous les feuilles mortes, les fumiers, les herbes sèches (r). (Thuisy.)

Atomaria, Er. — Sur les plantes aquatiques, sous les mousses, parfois avec les fourmis (rr). (Thuisy.)

Pussillima, Grav. — Sous les mousses, les feuilles sèches, etc.; quelquefois avec *Formica rufa* (c), +.

GYROPHAENA. — Mannerheim.

Puichella, Heer. — Dans les champignons (rr). (Rilly.)

Affinis, Sahl. — Dans les champignons, quelquefois dans le bois pourri (c), +.

Poweri, Crotch. — Dans les champignons et les agarics (rrr). (Rilly.)

Gentilis, Er. — Dans les champignons et les bolets (rr). (Rilly, Trigny, Merfy.)

Bihamata, Thoms. — Dans les champignons, les agarics, les bolets, quelquefois sous les écorces pourries (r), +.

Laevipennis, Kr. — Comme le précédent (rr) !

Manca, Er. — Dans les champignons des prairies, les agarics, les bolets (rr). (Cernay, Merfy.)

MYLLAENA. — Erichson.

Minuta, Grav. — Sous les mousses, les feuilles mortes, etc. (cc). +.

Digitized by Google

TACHYPORIDAE

HYPOCYPTUS. — Mannerheim.

Longicornis, Payk. — Sous les mousses, les feuilles sèches, les tas d'herbes, etc.; dans les endroits humides (cc), +.

Discoideus, Er. — Comme le précédent (rr). (Thuisy, Muizon.)

HABROCERUS. — Erichson.

Capillaricornis, Grav. — Sous les feuilles mortes, les mousses, les vieux fagots, etc. (c). +.

LEUCOPARYPHUS. — Kraatz.

Silphoïdes, Lin. — Sous les bouses, dans les fumiers, sous les herbes sèches (rr). (Sillery, Muizon.)

TACHINUS. — Gravenhorst.

Humeralis, Grav. — Sous les cadavres, les bouses, les débris végétaux (c), +.

Flavipes, F. — Dans les bouses, les crottins, les champignons (rr) !

Bipustulatus, F. — Dans les plaies des arbres, sous divers débris végétaux (rr). (Courcelles.)

Subterraneus, Lin. — Comme le précédent (c), +.

Elongatus, Gyll. — Dans les bouses, les fumiers, etc. (rr) !

Digitized by Google

TACHYPORUS. — Gravenhorst.

Obtusus, Lin. — Sous la mousse au pied des arbres (c), +.

Formosus, Math. — Sous les mousses, les vieux fagots, etc. (cc), +.

Solutus, Er. — Comme le précédent (cc), +.

Chrysomelinus, L. — Sous les feuilles mortes, les mousses; parfois avec *Formica rufa* ou *Lasius fuliginosus* (c), +.

Hypnorum, F. — Comme le précédent (ccc), +.

Ruficollis, Grav. — Sous les mousses dans les bois (rr). (Germaine.)

Humerosus, Er. — Sous les vieux bois, les mousses, etc. (rr) !

Pusillus, Grav. — Sous les herbes sèches, les mousses (r). (Muizon, Thuisy.)

Brunneus, F. — Comme les précédents (cc), +.

CONURUS. — Stephens.

Littoreus, L. — Sous les écorces, les vieux fagots, les herbes pourries (r). (Muizon, Thuisy.)

Pubescens, Grav. — Sous les herbes et autres détritus végétaux, dans les endroits marécageux (c), +.

Fusculus, Grav. — Comme le précédent (c), +.

Pedicularius, Grav. — Sous les feuilles mortes, les fagots, les herbes (c), +.

BOLITOBIUS. — Stephens.

Analis, Kry. — Sous les écorces, les mousses, les feuilles sèches, etc. (rrr) !

Digitized by Google

Cingulatus, MANH. — Sous les herbes coupées, dans les marais (RRR). (Thuisy.)

Atricapillus, F. — Dans les champignons en putréfaction (CC), +.

Trinotatus, ER. — Comme le précédent (CC), +.

Exoletus, ER. — Dans les champignons et aussi quelquefois sous les mousses (CC), +.

Pygmaeus, ER. — Comme le précédent (CC), +.

MYCETOPORUS. — MANNERHEIM.

Maerkeli, KR. — Sous les aiguilles de sapin dans les bois (RRR). (Ardennes.)

Lucidus, ER. — Sous les détritus végétaux (RR). (Muizon.)

Splendens, MARSH. — Dans les bois, sous les mousses, parmi les herbes au pied des arbres (C), +.

Nanus, ER. — En arrachant les herbes au pied des arbres (RR) !

Splendidus, GRAV. — Sous les feuilles mortes, les mousses, dans les vieux fagots, sous les herbes (C), +.

STAPHYLINIDAE

HETEROTHOPS. — STEPHENS.

Praevius, ER. — Sous des détritus végétaux (RR) ! (Thuisy.)

Dissimilis, GRAV. — Comme le précédent (R). (Thuisy, Courcelles, Cormontreuil.)

Digitized by Google

QUEDIUS. — Stephens.

Brevis, Er. — Dans les nids de *Formica rufa* (r). (Merfy.)

Ochripennis, Men. — Sous les détritus végétaux; aussi dans les celliers et les écuries (r). (Muizon, Courcelles.)

Fulgidus, F. — Comme le précédent (c), +.

Mesomelinus, Marsh. — Sous les mousses, les herbes; dans les champignons, les bouses, les plaies d'arbres (c), +.

Ventralis, Arag. — Sous les écorces, les mousses, dans les plaies des arbres (rr) !

Cinctus, Payk. — Dans les fumiers et les bouses; à la sève des arbres (cc), +.

Tristis, Grav. — Sous les écorces, dans les vieux fagots, les détritus végétaux (r). (Epernay, Brimont, Cernay.)

Fuliginosus, Grav. — Dans les champignons, les bouses, les fumiers (rr), +.

Molochinus, Grav. — Dans les détritus végétaux; dans les vieux arbres, avec *Lasius fuliginorus* (r), +.

Ochropterus, Er. — Trouvé par M. Warnier, à Taissy, en tamisant des herbes arrachées au pied d'un arbre.

Picipes, Manh. — Sous les mousses, les feuilles mortes, etc. (rr). (Germaine, Merfy.)

Nigriceps, Kr. — Comme le précédent (rr). (Avize.)

Obliteratus, Er. — Comme les précédents (rr). (Aussonce, Reims : Fléchambault.)

Maurorufus, Grav. — Sous les débris végétaux, les mousses, les roseaux coupés, dans les endroits humides (rrr). (Epernay, Thuisy.)

Digitized by Google

Rufipes, Grav. — Sous les mousses, les feuilles, les crottins (rr) !

Attenuatus, Gyl. — Comme le précédent (rr). (Germaine.)

Boops, Grav. — Comme les précédents (c). (Muizon, Thuisy, Taissy.)

ASTRAPAEUS. — Gravenhorst.

Ulmi, Rossi. — Sous les débris végétaux; dans les plaies des arbres, des ormes surtout (r), +.

CREOPHILUS. — Mannerheim.

Maxillosus, Lin. — Sous les cadavres, dans les fumiers, les bouses (cc), +.

EMUS. — Curtis.

Hirtus, L. — Dans les fumiers des ruminants; souvent au vol (rr). (Merfy, Germaine.)

LEISTOTROPHUS. — Perty.

Nebulosus, F. — Dans les fumiers et les bouses (rr), +.

Murinus, L. — Comme le précédent (c), +.

STAPHILINUS. - Linné.

Pubescens, de Geer. — Sous les cadavres, dans les fumiers, les bouses, surtout dans les bois (rr). (Berru, Germaine.)

Fulvipes, Scop. — Sous les mousses, les feuilles, les herbes sèches (rr). (Germaine.)

Stercorarius, Ol. — Sous les cadavres, dans les excréments, les bouses, etc. (c), +.

Digitized by Google

Chalcocephalus, F. — Sous les mousses, les feuilles mortes, dans les fumiers, les bouses, surtout dans les bois (R). (Germaine.)

Fossor, Scop. — Dans les bois sous les mousses, les écorces, dans les bouses (RR). (Germaine.)

Cesareus, Cederh. — Sous les herbes sèches, les mousses, les feuilles mortes; souvent courant à terre dans les champs (C), +.

OCYPUS. — Stephens.

Olens, Mull. — Sous les pierres, les herbes, etc., courant à terre sur les chemins (CCC), +.

Cyaneus, Payk. — Sous les pierres, dans les fumiers, les déjections animales (CC), +.

Similis, F. — Sous les feuilles, les mousses, les débris végétaux (RR). (Germaine, Rilly.)

Fulvipennis, Er. — Sous les pierres, dans les lieux arides; parfois courant à terre (RR) !

Cupreus, Rossi. — Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes (R), +.

Pedator, Grav. — Comme le précédent (R), +.

Ater, Grav. — Comme les précédents (R) !

Morio, Grav. — Comme les précédents; quelquefois avec *Lasius fuliginosus* (CC), +.

Compressus, Marsh. — Comme les précédents (RR). (Epernay, Chigny.)

ACTOBIUS. — Fauvel.

Cinerascens, Grav. — Sous les pierres, les mousses, les feuilles; sur la vase au bord des eaux (C), +.

Digitized by Google

Procerulus, Grav. — Dans les graviers au bord des eaux courantes (rr). (Ay.)

PHILONTHUS — Curtis.

Splendens, F. — Sous les cadavres, dans les bouses, les fumiers (rr) !

Cyanipennis, F. — Dans les champignons en putréfaction (rr). (Berru.)

Proximus, Kr. — Sous les petits cadavres, dans les plaies des arbres (rr), +.

Aeneus, Rossi. — Sous les pierres, les fumiers, les cadavres (cc), +.

Carbonarius, Gyll. — Comme le précédent (r), +.

Cephalotes, Grav. — Dans les fumiers, les crottins; sous les feuilles mortes (rr). (Germaine.)

Sordidus, Grav. — Sous les feuilles, les mousses, les fumiers (c), +.

Sanguinolentus, Grav. — Dans les bouses, les excréments, les fumiers (rr). (Germaine.)

Immundus, Gyl. — Sous les cadavres, les mousses, les feuilles sèches, parfois avec *Lasius fuliginosus* (r). (Muizon, Rilly.)

Ventralis, Grav. — Sous les mousses, dans les crottins, les bouses (r), +.

Debilis, Grav. — Sous les débris végétaux; quelquefois avec *Lasius fuliginosus* (r). (Avize, Brimont, Muizon, Thuizy.)

Discoïdeus, Grav. — Sous les feuilles mortes, dans les fumiers, les crottins (rr). (Courcelles, Ay.)

Atratus, Grav. — Comme le précédent (rr), +.

Digitized by Google

Ebeninus, GRAV. — Sous les petits cadavres, les débris végétaux et animaux; dans les bouses, les crottins (C), +.

Quisquiliarius, GYL. — Dans les fumiers; dans les graviers au bord des eaux (C), +. Dans les mêmes conditions on trouve aussi, mais rarement, la var. *rubidus*, ER.

Fimetarius, GRAV. — Sous les feuilles, les écorces; dans les fumiers, les champignons (C), +.

Nigritulus, GRAV. — Sous les mousses, les feuilles mortes, les débris végétaux; quelquefois au vol (C), +.

Politus, F. — Comme le précédent (RR) !

Varius, GYL. — Comme le précédent et avec *Formica rufa* (C), +. Trouvé une seule fois la var. *Bimaculatus*, ER. !

Marginatus, MUL. — Dans les fumiers et les bouses; trouvé par M. Charbonneaux à Villedommange.

Longicornis, STEPH. — Sous les pierres, les détritus végétaux; dans les graviers au bord des cours d'eau (RR). (Ay.)

Varians, PAYK. — Comme le précédent, tant le type que la var. *Agilis*, GRAV., (C), +.

Fumarius, GRAV. — Sous les débris végétaux dans les endroits marécageux (RR). (Thuisy, Muizon.)

Nigrita, GRAV. — Dans les endroits marécageux, sous les mousses, les feuilles mortes, etc. (RR). (Thuisy, en avril.)

Micans, GRAV. — En tamisant les herbes et les mousses arrachées au pied des arbres; sur la vase au fond des eaux stagnantes (C), +.

Exiguus, NORDM. — Sous les mousses, les feuilles mortes; sur la vase au bord des mares (RRR). (Germaine.)

Digitized by Google

XANTHOLINIDAE

XANTHOLINUS. — Serville.

Fulgidus, F. — Sous les feuilles mortes, dans le terreau des vieux arbres (RR), +.

Punctulatus, Payk. — Sous les mousses, les herbes, les écorces, les fumiers, les bouses; avec *Formica rufa* et *Lasius fuliginosus* (CCC), +.

Glabratus, Grav. — Comme le précédent (CC), +.

Tricolor, F. — Sous les herbes sèches, les mousses, les débris végétaux (C), +.

Linearis, Ol. — Comme les précédents (CCC), +.

LEPTACINUS. — Erichson.

Batychrus, Gyll. — Sous les mousses, les débris végétaux; dans le terreau des serres (C), +.

Formicetorum, Maerk. — Dans les nids de *Formica rufa* (C). (Cernay, Merfy.)

BAPTOLINUS. — Kraatz.

Affinis, Payk. — Sous les mousses; sous les écorces de sapin (RR). (Germaine.)

OTHIUS. — Stephens.

Fulvipennis, F. — Sous les mousses, au pied des arbres, sous les feuilles mortes, les herbes sèches, les vieux bois (R). (Thuisy, Muizon, Germaine.)

Digitized by Google

Myrmecophilus, KIESW. — Sous les feuilles mortes, les mousses, les écorces; avec *Formica congerens* et *Lasius fuliginosus* (RR). (Cernay, Merfy, Thuisy.)

Laeviusculus, STEPH. — Sous les feuilles mortes, les débris végétaux; dans le terreau des arbres (CC), +.

PAEDERIDAE

LATHROBIUM. — GRAVENHORST.

Punctatum, FOURC. — Sous les herbes coupées, dans les endroits marécageux (C). (Thuisy, Muizon, Cormontreuil.)

Elongatum, L. — Dans les détritus d'inondation (RR). (Ay.) !

Castaneipenne, KOLEN. — En tamisant des herbes sèches dans les marais (RRR). (Thuisy.)

Fulvipenne, GRAV. — Parmi les graviers au bord des cours d'eau (R). (Ay.)

Rufipenne, GYL. — Sous les herbes sèches, dans les marais (R). (Thuisy.)

Filiforme, GRAV. — Un seul exemplaire, trouvé en décembre en tamisant des herbes sèches dans les marais de Muizon.

Multipunctatum, PAYK. — Sous les débris végétaux dans les endroits marécageux; sur le gravier au bord des cours d'eau (R). (Muizon, Courcelles.)

Quadratum, PAYK. — Comme le précédent (RR). (Courcelles.)

Fovulum, STEPH. — Comme les précédents (RR) !

Digitized by Google

ACHENNIUM. — Curtis.

Depressum, Grav. — Dans les détritus d'inondation (c). (Ay.)

CRYPTOBIUM. — Mannerheim.

Fracticorne. Payk. — Dans les endroits humides, sous les feuilles, les herbes, etc. (c). (Thuisy, Cormontreuil, Muizon.)

STILICUS. — Latreille.

Subtilis, Er. — Sous les herbes, les feuilles mortes, les vieux fagots (r). (Thuisy, Germaine, Courcelles.)

Rufipes, Germ. — En tamisant des herbes arrachées au pied des arbres (rr) !

Orbiculatus, Kr. — Sous les débris végétaux au bord des eaux; aussi avec *Formica rufa* (rr). (Merfy.)

Similis, Er. — Dans les détritus d'inondation; sous les feuilles mortes, les herbes; dans les vieux fagots (rr). (Ay, Rilly.)

Affinis, Er. — Comme le précédent (cc), +.

Fragilis, Grav. — En tamisant des herbes coupées dans les marais (rr). (Thuisy, Muizon.)

SCOPAEUS. — Erichson.

Cognatus, Muls. — Un seul exemplaire, trouvé par M. Warnier, dans des détritus végétaux !

Digitized by Google

LITHOCHARIS. – Lacordaire.

Fuscula, Manh. — Sous les débris végétaux, les vieux bois, les écorces (rr). (Thuisy.)

Ripicola, Kr. — Sur les graviers des rivières, sous les détritus végétaux humides (rr), +.

Apicalis, Kr. — Comme le précédent (rr). (Thuisy.)

Ochracea, Grav. — Sous les herbes, les écorces; parfois avec les fourmis (r), +.

Obsoleta, Nordm. — Dans les marais en tamisant des herbes et des roseaux coupés (c). (Thuisy, Muizon.)

Propinqua, Bris. — Sous les mousses, les feuilles mortes, les herbes (c), +.

Ruficollis, Kr. — Comme le précédent; aussi sur les graviers au bord des eaux (rr), +.

Melanocephala, F. — Sous les pierres, les herbes, les détritus de toute nature (ccc), +.

SUNIUS. – Stephens.

Filiformis, Latr. — Sous les pierres, les débris végétaux, etc. (cc), +.

Intermedius, Er. — Comme le précédent; quelquefois avec *Formica rufa* (cc), +.

Gracilis, Payk. — Sous les débris végétaux, la paille des meules de blé, les écorces (cc), +.

PAEDERUS. — Gravenhorst.

Gregarius, Scop. — Sous les détritus végétaux dans les endroits humides (cc), +.

Digitized by Google

Riparius, L. — Comme le précédent (R), +.

Caligatus, ER. — Sous les pierres au bord des eaux; sous les détritus végétaux dans les endroits humides (R), +.

Longipennis, ER. — Sous la mousse au pied des arbres, les feuilles mortes, les herbes (CC), +.

Ruficollis, F. — Sur les graviers au bord des cours d'eau (RR). (Ay.)

STENIDAE

EVAESTHETUS. — GRAV.

Ruficapillus, LACD. — Sous les feuilles mortes, les herbes, les détritus végétaux (RR). (Thuisy, Saint-Brice.)

DIANOUS. — CURTIS.

Caerulescens, GYLL. — Au bord des eaux vives, des cressonnières, sous les mousses et les herbes très humides au bord des eaux (RR), +.

STENUS. — LATREILLE.

Biguttatus, L. — Sur la vase, le gravier au bord des eaux; sous les débris végétaux et détritus d'inondation (R). (Ay.)

Bipunctatus, ER. — Comme le précédent (R). (Ay, Châlons-sur-Marne, Muizon.)

Guttula, MÜLL. — Sur les graviers au bord des eaux courantes (C). (Ay.)

Digitized by Google

Aterrimus, Er. — Dans les fourmilières de *Formica rufa* et *pratensis* (r). (Châlons-sur-Vesle, Merfy.)

Declaratus, Er. — Sous les mousses, les débris végétaux, les feuilles mortes (rr). (Brimont.)

Bimaculatus, Gyl. — Sous les pierres, les détritus végétaux au bord des eaux courantes ou stagnantes (cc) ! (Thuisy, Muizon.)

Speculator, Lacd. — Sous les débris végétaux, les vieux bois, sur les graviers au bord des cours d'eau (r), +.

Providus, Er. — Comme le précédent (cc), +.

Ater, Manh. — Sous les pierres dans les endroits secs; sous les écorces, les feuilles mortes, les mousses (c), +.

Juno, F. — Dans les bois et les endroits marécageux; sous les détritus végétaux (c), +.

Buphthalmus, Grav. — Sous les herbes au bord des eaux (r). (Ay.)

Canaliculatus, Gyl. — Dans les endroits humides, sous les mousses, les feuilles sèches, etc. (r). (Brimont, Cernay.)

Morio, Grav. — Au pied des roseaux dans les marais; sous les détritus végétaux dans les endrois humides (rr). (Courcelles, Cormontreuil.)

Vafellus, Er. — Dans les endroits marécageux sous les herbes; dans les détritus d'inondation (rr). (Thuisy, Taissy.)

Fuscipes, Grav. — Comme le précédent (c). (Muizon, Ay.

Unicolor, Er. — Sous les feuilles mortes, les mousses, les herbes (c), +.

Digitized by Google

Latifrons, Er. — Dans les endroits humides, sous les feuilles, les herbes, etc. (rr). (Brimont, Cormontreuil.)

Tarsalis, Ljung. — Sous les détritus, les mousses, au bord des cours d'eau (cc), +.

Oculatus, Grav. — Dans les vieux fagots, sous les mousses, les feuilles sèches (cc), +.

Solutus, Er. — Dans les marais, sous les herbes très humides, les débris de roseaux (rr). (Sillery, Thuisy, Taissy.)

Cicindeloïdes, Grav. — Dans les marais, sous les herbes, les mousses; parfois dans les détritus d'inondation (cc), +.

Kiesenwetteri, Rosh. — Dans les marais, sous les herbes très humides, les touffes de joncs, au pied des *eupatorium* (rrr). (Thuisy.)

Contractus, Er. — Sur les plantes aquatiques, sous les pierres au bord des fossés et des mares (rr) !

Binotatus, Ljung. — Dans les détritus d'inondation (rr). (Courcelles, Sillery.)

Picipes, Steph. — Dans les endroits humides, sous les débris végétaux (rr) !

Filum, Er. — Sous les détritus, les feuilles mortes, au bord des eaux; quelquefois sur les fleurs du *Colchicum autumnale* (cc), +.

Elegans, Rosh. — Dans les bois, sous les feuilles mortes, les mousses (rr). (Germaine.)

Subaeneus, Er. — Sous les mousses, les herbes, etc., dans les endroits humides (c). (Thuisy, Chigny, Muizon.)

Digitized by Google

Impressus, GERM. — Dans les fagots, sous les mousses, les écorces (R). (Germaine, Rilly.)

Ossium, STEPH. — Comme le précédent (RR). (Germaine.)

Geniculatus, GRAV. — Dans les bois, sous les mousses, les feuilles sèches (RR). (Merfy.)

Pallipes, GRAV. — Dans les endroits humides, sous les feuilles, les détritus (RR), +.

Palustris, ER. — Dans les endroits marécageux, sous les roseaux coupés, les herbes, etc. (RR). (Thuisy).

Fuscicornis, ER. — Comme le précédent (R). (Courcelles).

Flavipes, ER. — Dans les fagots; sous les détritus végétaux, dans les marais; quelquefois avec *Lasius fuliginosus* (RR). (Thuisy.)

OXYTELIDAE

OXYPORUS. — F.

Rufus, L. — Dans les agarics, surtout *Agaricus pratensis*, *edulis*, *campestris* (CC), +.

BLEDIUS. — MANNERHEIM.

Opacus, BLOCK. — Dans les sablières; quelquefois sur la vase au bord des eaux (C), +.

Pygmaeus, ER. — Comme le précédent (RR). (Châlons-sur-Vesle.)

Crassicollis, LACD. — Dans les bois, au bord des ruisseaux et des petites mares (RR). (Germaine.)

Fracticornis, PAYK. — Comme le précédent (R). (Germaine.)

Digitized by Google

PLATYSTETHUS. — Mannerheim.

Spinosus, Er. — Sous les bouses, les détritus végétaux; sur les graviers au bord des cours d'eau (rr). (Ay.)

Nitens, Sahl. — Dans les endroits humides, sous les bouses, les végétaux en décomposition, etc. (r). (Germaine.)

Cornutus, Grav. — Sur la vase, sous les pierres au bord des mares, dans les bouses (cc), +.

Morsitans, Payk. — Dans les bouses, les crottins, les fumiers (c), +.

OXYTELUS. — Gravenhorst.

Rugosus, F. — Dans les bouses, les fumiers, etc. +.

Insecatus, Grav. — Sous les feuilles, les débris végétaux (rr). (Berru, Cernay.)

Sculptus, Grav. — Dans les bois, sous les feuilles mortes, les mousses; au vol le soir (r). (Berru, Trigny.)

Inustus, Grav. — Dans les déjections animales; sous les feuilles, les fumiers (c), +.

Sculpturatus, Grav. — Sous les cadavres; dans les bouses, les fumiers; souvent au vol (ccc), +.

Complanatus, Er. — Comme le précédent (c), +.

Nitidulus, Grav. — Comme les précédents (cc), +.

Depressus, Grav. — Dans les bouses, les excréments, les fumiers, les champignons décomposés; le soir au vol (ccc), +.

Clypeonitens, Pand. — Comme le précédent (rr) !

Digitized by Google

HAPLODERUS. — Stephens.

Caelatus, Grav. — Dans les fumiers, les bouses: sous les mousses humides (r), +.

TROGOPHLOEUS. — Mannerheim.

Bilineatus, Steph. — Au bord des eaux, sous les pierres, les herbes, les détritus (c). (Thuisy, Ay.)

Erichsónis, Sharp. — Sur le sable et la vase, au bord des eaux (c). (Thuisy.)

Elongatulus, Er. — Comme le précédent (r), +.

Corticinus, Er. — Sous les herbes, les feuilles mortes, les pierres au bord de l'eau (c). (Courcelles, Thuisy.)

COPROPHILUS. — Latreille.

Striatulus, F. — Dans les bouses; sous les écorces, les feuilles sèches (rr) !

DELEASTER — Erichson.

Dichrous, Grav. — Sur le sable, le gravier au bord des eaux (rr). (Ay.)

OMALIDAE

ANTHOPHAGUS. — Gravenhorst.

Armiger, Grav. — Sur les sapins, les saules, les graminées; sur l'épine blanche en fleur (rr). (Rethel, Germaine.)

Caraboides, L. — Comme le précédent (r). (Germaine.)

Digitized by Google

LESTEVA. - Latreille.

Bicolor, F. — Dans les endroits humides, sous les mousses, les feuilles; quelquefois sur les fleurs (R), +.

Heeri, Fauv. — Sous les pierres, les mousses humides, les feuilles: dans les marais sous les herbes (RR). (Thuisy.)

ACIDOTA. — Stephens.

Cruentata, Manh. - Sous les écorces de sapin (RR). (Aussonce.)

OLOPHRUM — Erichson.

Piceum, Gyll. — Dans les marais sous les herbes coupées (RR). (Thuisy.)

LATHRIMAEUM. — Erichson.

Luteum, Er. — Sous les écorces de sapin; dans les vieux fagots (R). (Merfy, Berru.)

Atrocephalum, Gyl. — Comme le précédent (CC) ,+.

OMALIUM. — Gravenhorst.

Rivulare, Payk. — Dans les champignons, les vieux fagots; sur les fleurs dans les bois (CC), +.

Allardi, Fairm. — Dans les fumiers (RR). (Thuisy, en avril.)

Caesum, Grav. - Dans les fumiers, les détritus, les vieux fagots (R). (Germaine.)

Oxyacanthae, Grav. — Dans les détritus; parfois sur les fleurs (RR) !

Digitized by Google

Pusillum, GRAV. — Sous les écorces de sapin, de chêne, etc. (CC). (Brimont, Chigny, Merfy.)

Planum, PAYK. — Comme le précédent (C), +.

Concinnum, MARSH. — Sous les écorces de sapin; dans les fagots, les fumiers; sur les fleurs (R , (Thuisy, Rethel.)

Lucidum, ER. — Sous les écorces de sapin; sur les fleurs d'aubépine (R). (Cernay, Saint-Brice.)

Florale, ER. — Sur les fleurs de genêt ou d'aubépine; dans les fumiers et les détritus (CC), +.

Striatum, GRAV. — Dans les fumiers, les bouses etc. (RR) !

ANTHOBIUM. — STEPHENS.

Abdominale, GRAV. — Sur les fleurs d'aubépine, de prunellier (R). (Germaine, Rilly.)

Nigrum, ER. — Comme le précédent (RR). (Germaine.)

Florale, PANZ. — Comme les précédents (RR)! (Chigny, Germaine.)

Minutum. — Sur l'aubépine, sur les fleurs de mauves, de renoncule, etc. (CC), +.

Torquatum, MARSH. — Sur les fleurs de genêt, d'aubépine (CC), +.

PROTEINIDAE

PROTEINUS. — LATREILLE.

Brevicollis, ER. — Dans les vieux fagots; dans les champignons en décomposition (CC), +.

Brachypterus, F. — Comme le précédent (CC), +.

Digitized by Google

Limbatus, MAEKL. — Dans les détritus végétaux, les vieux fagots, etc. (RR) !

Atomarius, ER. — Dans les champignons en décomposition (RRR). (Chigny.)

MEGARTHRUS. — STEPHENS.

Depressus, PAYK. — Dans les vieux fagots, sous les écorces, dans les bouses (RR). (Rilly.)

Denticollis, BECK. — Dans les détritus végétaux (RR). (Courcelles.)

Sinuatocollis, LACD. — Dans les fagots de chêne ou de sapin (RR). (Rilly.)

Hemipterus, ILLIG. — Dans les bois, dans les bolets et les champignons (R), +.

PHLOEOBIUM. — ERICHSON.

Clypeatum, MÜLL. — Dans les vieux fagots, sous les écorces, les feuilles, les mousses (C), +.

MICROPEPLIDAE

MICROPEPLUS. — LATREILLE.

Porcatus, PAYK. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres, les feuilles mortes, les mousses (R). (Châlons-sur-Vesle, Brimont.)

Digitized by Google

PSELAPHIDES

PSELAPHUS. — Herbst.

Heisei, Herbst. — En tamisant les mousses, les feuilles sèches; quelquefois avec les fourmis (cc), +.

Dresdensis, Herbst. — Un seul exemplaire trouvé en octobre sous des herbes sèches. (Thuisy.)

TYCHUS — Leach.

Niger, Payk. — En tamisant des détritus végétaux; aussi avec *Formica rufa* (rr). (Ay, Merfy.)

BRYAXIS. — Leach.

Sanguinea, F. — Sous les feuilles, les mousses, dans le terreau des vieux arbres, etc. (cc), +.

Fossulata, Reichb. — Mêmes mœurs) (cc'), +.

Haemoptera, A. — Dans les détritus d'inondation (rr). (Ay.)

Lefebvrei, A. — En tamisant des détritus végétaux dans les endroits humides (r). (Ay.) !

Haematica, Reichb. — Dans les détritus d'inondation; sous les pierres avec *Lasius fuliginosus* (r). (Ay, Germaine.) !

Antennata, A. — Dans les endroits marécageux, sous les herbes, les mousses, etc. (cc), +.

Digitized by Google

Juncorum, LEACH. — En fauchant dans les endroits humides; quelquefois avec les fourmis (RR). (Germaine, Rilly.)

Guillemardi, SAULCY. — Dans les détritus d'inondation (RRR). (Ay.)

BYTHINUS. — LEACH.

Bulbifer, REICHB. — Sous les mousses, les feuilles sèches, etc., dans les endroits humides (C). (Muizon, Thuisy, Cormontreuil.)

Curtisi, LEACH. — Comme le précédent, quelquefois avec *Formica rufa* (RR). (Thuisy, Merfy.)

Distinctus, CHAUD. — Sous des détritus végétaux (RRR) !

Burelli, DENNY. — Sous les mousses, les feuilles sèches, etc., sous les pierres avec *Lasius fuliginosus* (RR) !

EUPLECTUS. — LEACH.

Signatus, REICHB. — Sous les écorces des vieux arbres; aussi dans les nids de *Formica rufa* (R). (Merfy.)

Sanguineus, DENNY. — Dans le terreau des vieux arbres (RR) !

Karsteni, REICHB. — Comme le précédent (RRR) ! (Muizon.)

CLAVIGER. — PREYSSLER.

Foveolatus, MÜLL. — Sous les pierres recouvrant les nids de *Formica rufa* et *Formica coespitum* (RRR) ! (Germaine.)

Longicornis, MÜLL. — Dans les nids de *Formica mixta* (RRR). (Trigny.)

Digitized by Google

SCYMENIDES

SCYDMENUS. — Latreille.

Scutellaris, Müll. — Sous les détritus végétaux et dans les nids de *Formica rufa* (R). (Merfy.) !

Collaris, Müll. — Dans les endroits marécageux au pied des plantes et dans les nids de *Lasius fuliginosus* et de *Formica rufa* (RR). (Brimont, Cormontreuil.)

Pusillus, Müll. — Sous les pierres et les détritus au bord des eaux (RR). (Cormontreuil.)

Angulatus, Müll. — Comme le précédent (RR). (Cormontreuil.)

Sparshalli, Denny. — Dans les végétaux en décomposition (RR). (Courcelles.)

Denticornis, Müll. — Comme le précédent (RR). (Thuisy.) !

Hirticollis, Illig. — Dans les détritus d'inondation (RR). (Ay.)

Confusus, Bris. — Comme les précédents (RR) !

Digitized by Google

Wetterhali, GYL. — Sous les écorces habitées par les fourmis; sous les mousses, les feuilles sèches, etc. (C), +.

Rufus, MÜLL. — Dans les endroits humides, sous les pierres, les tas d'herbes etc., (R) !¡

EUTHEIA. — STEPHENS.

Plicata, GYLL. — Sous les mousses et les herbes sèches; souvent en compagnie de *Lasius fuliginosus* (RR). (Sillery.)

CEPHENNIUM. — MÜLL.

Thoracicum, MÜLL. -- Dans les endroits humides, sous les mousses, les herbes etc., (RR). (Courcelles.)

Digitized by Google

CLAVICORNES

SILPHIDAE

NECROPHORUS. — Fabricius.

Germanicus, L. — Sous les cadavres dans les champs (RR). (Berru, Germaine.)

Humator, Goez. — Comme le précédent (RR) !

Vespillo, L. — Sous les charognes; quelquefois dans les champignons en décomposition (CC), +.

Vestigator, Hersch. — Sous les cadavres (CC), +.

Fossor, Er. — Comme le précédent (C), +.

Sepultor, Charp. — Sous les cadavres dans les champs (RR) !

Mortuorum, F. — Dans les bois, sous les cadavres, les matières en décomposition (C), +.

SILPHA. — Linné.

Littoralis, L. — Au bord des eaux sous les cadavres; sous les poissons morts, les animaux noyés et rejetés par les eaux (R), +.

Digitized by Google

Thoracica, L. — Dans les bois sous les cadavres (cc), +.

Rugosa, L. — Dans les matières animales en décomposition (rr). (Germaine.)

Sinuata, F. — Dans les champs, sous les cadavres et les matières animales en décomposition (ccc), +.

Opaca, L. — Dans les champs de betteraves où la larve produit de grands dégâts. — Trouvé aussi au pied des pommiers pendant l'hiver (c). (Loivre, Trigny.)

4 Punctata, L. — Dans les bois de chêne sur les arbres et sous les feuilles mortes ; dans les nids de chenilles processionnaires (cc). (Germaine, Rilly.)

Carinata, Illig. — Sous la mousse au pied des arbres (rr.) (Merfy, Germaine.)

Reticulata, F. — Dans les bois sous les mousses ; quelquefois courant à même sur les chemins (rrr.) (Merfy, Germaine.)

Tristis, Illig. — Dans les champs sous les végétaux pourris, les pierres (r). (Muizon, Germaine.)

Obscura, L. — Dans les champs sous divers abris ou courant à terre (ccc), +.

Laevigata, F. — Comme le précédent, souvent dévorant des lombrics, limaces, escargots, etc. (ccc), +. D'après Redtenbacher, la larve de cette espèce causerait des ravages dans les plantations de betteraves.

Atrata, L. — Sous les feuilles sèches, la mousse au pied des arbres, les vieilles écorces, etc. (ccc), +.

CHOLEVA. — Latreille.

Sturmi, Bris. — Mêmes mœurs (r) ! Berru, (Ay.)

Digitized by Google

Angustata, F. — Sous les feuilles mortes et autres abris végétaux; souvent dans les sablières (C). On trouve plus souvent la var. *Cisteloides*, FROEHL.

CATOPS. — PAYKULL.

Picipes. F. — Dans les détritus végétaux (RR) !

Nigricans, SPENC. — Dans le fumier, surtout celui des gallinacées; quelquefois au pied des murs (C) !

Morio, F. — Sous la mousse au pied des arbres; dans les matières animales en décomposition (RR). (Muizon, Merfy.)

Nigrita, ER. — Dans les endroits humides, sous des détritus végétaux (R). (Muizon, Taissy, Thuisy.)

Chrysomeloides, PANZ. — Sous la mousse au pied des arbres; dans les fumiers de poule et de pigeon (R) ! (Thuisy, Muizon.)

Watsoni, SPENC. — Dans les matières animales ou végétales en décomposition (RR). (Thuisy, Muizon.)

Fumatus, SPENC. — Sous la mousse au pied des arbres (RR). (Germaine.)

Velox, SPENC. — Dans les détritus végétaux humides (RRR). (Thuisy.)

Praecox, ER. — Dans les bois sous les feuilles sèches (RRR). (Germaine.)

Sericeus, F. — Sous les herbes sèches, les feuilles mortes, etc.; quelquefois avec les fourmis (CC), +.

Anisotomoides, SPENC. — Dans les endroits humides sous divers détritus (CC), +.

AGYRTES. — FROEHLICH.

Castaneus, F. — Au vol le soir; quelquefois sous les écorces (R) ! (Muizon.)

Digitized by Google

Bicolor, CAST. — Sous les écorces (RRR). (Germaine.) (DEMAISON.)

ANISOTOMIDAE

HYDNOBIUS. — SCHMIDT.

Punctatissimus, STEPH. — Dans les endroits humides, sous les herbes coupées, les feuilles, etc. (RRR). (St-Brice.)

Punctatus, STURM. — En fauchant dans les clairières des bois (RRR). (Germaine.)

ANISOTOMA. — ILLIGER.

Cinnamomea, PANZ. — Dans les truffes (RR). (Rilly, Thuisy, Verzy.)

Nigrita, SCHT. — En tamisant des mousse et des feuilles séches (RRR). (Germaine.)

Rubiginosa, SCHT. — En fauchant le soir dans les bois (RRR). (Aussonce.) (Abbé HÉNON.)

Calcarata, ER. — En fauchant dans les clairières des bois (RR). Pris une fois dans une grévière au bord de la Marne à Ay.

Badia, STURM. — Dans les endroits humides, sous les herbes, les feuilles, etc. (RR). (Jonchery, Courcelles.)

COLENIS. — ERICHSON.

Dentipes, GYL. — Dans les détritus d'inondation (RRR). (Cormontreuil.)

LIODES. — LATREILLE.

Glabra, KUGL. — Dans les champignons et divers végétaux en décomposition (RRR). (Rilly.)

Digitized by Google

AGATHIDIUM. — Illiger.

Nigripenne, Kugl. — Sous les écorces d'arbres abattus (r) ! (Rilly.)

Atrum, Payk. — Dans les endroits humides, en tamisant des herbes sèches; quelquefois sous les écorces (r) ! (Thuisy.)

Laevigatum, Er. — Comme le précédent; trouvé aussi en secouant des vieux fagots (rr). (Thuisy, Courcelles.)

Rotundatum, Gyl. — Comme le précédent (r). (Rilly, Muizon.)

CLAMBIDAE

CLAMBUS. — Fischer.

Armadillo, de Geer. — En tamisant les détritus d'inondation; quelquefois avec *Lasius fuliginosus* (r). (Taissy, Muizon.)

CALYPTOMERUS. — Redtenbacher.

Dubius, Marsh. — Dans les vieux fagots, les vieux chaumes, etc. (c). (Bazancourt, Thuisy.)

CORYLOPHIDAE

SERICODERUS. — Stephens.

Lateralis, Gyl. — Dans les endroits marécageux, sous les feuilles mortes, les herbes coupées, etc. (cc). (Thuisy, Muizon.)

Digitized by Google

CORYLOPHUS. — Stephens.

Cassidioides, Marsh. — Comme le précédent (cc), +.

ORTHOPERUS. — Stepheas.

Brunnipes, Gyl. — En secouant des toitures de chaume; dans les nids de *Formica rufa* (rr). (Merfy.)

Atomus, Gyll. — Dans les caves et celliers, dans les moisissures des tonneaux et des vieilles planches (rr) !

Atomarius, Heer. — Dans les endroits humides sous des détritus végétaux; quelquefois comme le précédent (r). (Courcelles.)

TRICHOPTERIDAE

PTINELLA. — Motschulski.

Aptera, Guer. — Sous les écorces de sapin dans le terreau provenant des déjections de larves de *Longicornes* et de *Xylophages* (rr). (Thuisy.)

TRICHOPTERYX. — Kirby.

Montandoni, Alib. — Dans les nids de *Formica rufa* (rr). (Trigny.)

Fascicularis, Herbst. — Le soir au vol autour des fumiers; dans les détritus végétaux envahis par la *Formica nigra* (cc). (Thuisy, Muizon.)

Lata, Mots. — Comme le précédent (r) ! (Thuisy, Sillery.)

Atomaria, de Geer. — Dans les détritus végétaux (cc), +.

Digitized by Google

Grandicollis, MANH. — Dans les bouses des ruminants; aussi avec *Formica rufa* et *Lasius fuliginosus* (R) ! (Muizon, Germaine.)

NEPHANES. — THOMSON.

Titan, NEWRN. — Dans les crottins desséchés de cheval (RR) !

PTILIUM. — GYLLENHAL.

Myrmecophilum, ALIB. Dans les nids de *Formica rufa* (C). (Merfy, Cernay.)

Affine, ER. — Comme le précédent (RR). (Merfy.)

Caesum, ER. — Trouvé à Muizon par M. Bellevoye.

PTENIDIUM. — ERICHSON.

Apicale, ER. — Dans les nids de *Formica rufa* (CC). (Merfy, Brimont.)

Fuscicorne, ER. — Dans les détritus végétaux; souvent aussi dans les fourmilières (C) ! (Thuisy.)

SCAPHIDIDAE

SCAPHIDIUM. — OLIVIER.

4. Maculatum, OL. — Sous les écorces couvertes de petits champignons (C). (Rilly, Germaine, Merfy.)

SCAPHIUM. — KIRBY.

Immaculatum, OL. — Dans les sapinières, sous les mousses, dans les bolets et les champignons (R). (Merfy, Berru, Thuisy.)

Digitized by Google

SCAPHISOMA. — Leach.

Agaricinum, L. — Dans les agarics et sous les écorces recouvertes de bolets (cc), +.

Boleti, Panz. — Comme le précédent (r). (Merfy, Rilly.)

HISTERIDAE

HISTER. — Linné.

4. Maculatus, L. — Dans les bouses, sous les cadavres, dans les fumiers (ccc); on trouve aussi communément que le type la var. *Gagates*. (Illig.) +.

Unicolor, L. — Comme le précédent, et aussi quelquefois dans les plaies des arbres (c), +.

Cadaverinus, Hoffm. — Dans les fumiers; dans les troncs d'arbres atteints de carie humide (rr) !

Neglectus, Germ. — Dans les bouses (rr) ! (Germaine.)

Ignobilis, Mars. — Dans les charognes (rr) !

Carbonarius, Hoffm. — Dans les matières organiques en décomposition; quelquefois avec *Lasius fuliginosus* (rr) ! (Ay, Thuisy.)

Ventralis, Mars. — Dans les bouses, les fumiers (r). (Germaine.) !

Purpurascens, Herbst. — Comme le précédent; aussi sous les écorces des vieux chênes (r) ! (Merfy, Germaine.)

Nigellatus, Germ. — Dans les bolets et les agarics pourris (rr) !

Stercorarius, Hoffm. — Dans les bouses, les fumiers, etc. (cc), +.

Digitized by Google

4. Notatus, Scrib. — Comme le précédent (cc), +.

Bimaculatus, L. — Dans les bouses (rr). (Courcelles, Germaine.)

12. Striatus, Schrk. — Comme les précédents; quelquefois dans le bois pourri et aussi dans les détritus d'inondation (cc), +.

Corvinus, Germ. — Dans les matières organiques en décomposition; dans les bolets; aussi avec les fourmis (c), +.

HETAERIUS. — Erichson.

Sesquicornis, Preyssl. — Dans les bois sous les pierres avec diverses espèces de fourmis (rrr). (Trigny.)

DENDROPHILUS. — Leach.

Pygmaeus, L. — Dans les nids de *Formica rufa* (rr). (Merfy, Châlons-sur-Vesle.)

SAPRINUS. — Erichson.

Nitidulus, Payk. — Dans les bouses, les fumiers, etc. (cc), +.

Subnitidus, Mars. — Mêmes mœurs (c), +.

Speculifer, Latr. — Comme les précédents (c), +.

Aeneus, F. — Comme les précédents (cc), +.

Virescens, Payk. — Dans les matières organiques en décomposition (rrr). (Gueux, Thilloy.)

Rotundatus, Illig. — Dans la carie des vieux arbres; dans les sablières, sous les charognes (c), +.

Digitized by Google

MYRMETES. — DE MARSEUL.

Piceus, PALK. — Dans les nids de *Formica rufa* (RR). (Trigny.) (WARNIER.)

ONTHOPHILUS.

Sulcatus, F. — Dans les matières organiques en décomposition (RR). (Germaine.)

Striatus, FORST. — Dans les bouses de ruminants (CC), +.

ACRITUS. — LE CONTE,

Minutus, HERBST. — Dans les fumiers (R). (Chigny.)

PHALACRIDAE

PHALACRUS. — PAYKULL.

Corruscus, PAYK. — Sous les écorces, les feuilles sèches, les herbes, etc. (CCC), +.

OLIBRUS. — ERICHSON.

Corticalis, PANZ. — En hiver sous les écorces de platane; l'été en fauchant (CCC), +.

Aeneus, ILLIG. — Dans les bois en battant les sapins; en fauchant, sur les fleurs et les plantes, dans les prairies (R). (Bazancourt, Châlons-sur-Vesle.)

Anthemidis, PERR. — L'été en fauchant (RR). (Thuisy.) La larve vit dans les fleurs de l'*Anthemis mixta*.

Bicolor, F. — Dans les endroits humides, sous les feuilles, les herbes sèches, etc. (CC), +.

Digitized by Google

Liquidus, Er. — Comme le précédent (r). (Muizon.)

Affinis, Sturm. — En fauchant dans les prairies (cc), +.

Millefolii, Palk. — Sur *Achillea millefolium* (cc), +.

Pygmaeus, Sturm. — En battant les sapins et en fauchant dans les clairières (r). (Bazancourt, Merfy.)

Geminus, Illig. — En fauchant dans les prairies (cc), +. Les larves de cette espèce et de la suivante vivent sur *Filago gallica*.

Piceus, Steph. — Comme le précédent (cc), +.

Oblongus, Er. — Dans les endroits marécageux en fauchant (cc). (Thuisy, Muizon, Jonchery.)

NITIDULIDAE

CERCUS. — Latreille.

Pedicularius, L. — Dans les endroits humides, sur les plantes et arbustes en fleurs (cc), +.

Sambucci, Er. — Sur le sureau (c), +.

Rufilabris, Latr. — Dans les marais en fauchant, sur les joncs (r). (Thuisy, Courcelles.) La larve vit dans les fleurs de *Juncus obtusiflorus*.

BRACHYPTERUS. — Kugelann.

Cinereus, Heer. — Sur les fleurs de *Linaria vulgaris* (r) ! (Rilly.)

Linariae, Corn. — Sur les fleurs de *Linaria striata* (c) ! (Germaine, Thuisy.)

Pubescens, Er. — Sur les fleurs (cc), +.

Digitized by Google

CARPOPHILUS. — Leach.

Hemipterus, L. — Dans les matières végétales en fermentation ; souvent dans les figues sèches (R) ! (Trigny.)

6. **Pustulatus**, F. — Sous les écorces des arbres malades (C) ! (Trigny, Chigny, Thuisy.)

EPURAEA. — Erichson.

Diffusa, Bris. — Dans les champignons des bois (RRR). (Berru.)

Aestiva, L. — Au printemps sur les arbres en fleurs (C). (Germaine, Berru, Merfy.)

Melina, Er. — Sur les fleurs d'aubépine (RR). (Brimont.)

Immunda, Er. — En mai, dans la sève coulant des troncs d'arbres coupés (RR). (Germaine.) (Bellevoye.)

Neglecta, Heer. — Sur les fleurs d'aubépine (RR). (Ardennes.)

Parvula, Sturm. — Dans les plaies humides de divers arbres ; trouvé une fois en nombre en septembre dans des champignons (RR). (Berru, Germaine.)

Obsoleta, F. — Dans les plaies des ormes ; quelquefois sur les fleurs dans les bois (C). (Merfy, Berru.)

Pusilla, Illig. — Sur l'aubépine (C). (Thuisy, Merfy.)

Oblonga, Herbst. — Dans les plaies de divers arbres (RR). (Epernay.)

Fussi, Reitt. — Sur les arbustes en fleurs (RRR). (Germaine.)

Florea, Er. — Sur les arbres fruitiers en fleurs (R) ! (Chigny, Germaine.)

Digitized by Google

Melanocephala, MARSH. — L'hiver dans les vieux fagots; l'été sur les arbustes en fleurs (RRR). (Chigny, Berru.)

NITIDULA. — FABRICIUS.

Bipustulata, L. — Sous les matières animales en décomposition (RR). (Avize.) (DEMAISON.)

Obscura, F. — Comme le précédent; quelquefois le soir au vol (R) ! (Châlons-sur-Vesle.)

4. Pustulata, F. — Sous les charognes; dans les vieux os (RR). (Merfy, Germaine.)

SORONIA. — ERICHSON.

Grisea, L. — Dans les plaies des arbres, des ormes surtout (C) ! (Courcelles.)

AMPHOTIS. — ERICHSON.

Marginata, F. — Sous les écorces d'arbres envahies par *Lasius fuliginosus* (RRR). (Germaine.)

OMOSITA. — ERICHSON.

Depressa, L. — Dans les matières animales en décomposition (RR). (Fismes.)

Colon, L. — Sous les détritus végétaux; dans les plaies humides de chêne; dans les vieux os (CC), +.

Discoïdea, F. — Comme le précédent (C), +.

THALYCRA. — ERICHSON.

Fervida, OL. — Un seul exemplaire trouvé à Cernay par M. Bellevoye.

Digitized by Google

PRIA. — Stephens.

Dulcamarae, Illig. — Sur *Salanum dulcamara* (c), +.

MELIGETHES. — Stephens.

Rufipes, L. — Dans les bois, en fauchant sur les plantes (r). +.

Coracinus, Sturm. — Sur les fleurs des *Galium* (c) ! (Muizon, Germaine.)

Subaeneus, Sturm. – Dans les endroits marécageux, sur les fleurs (r). (Courcelles, Thuisy.)

Aeneus, F. — Sur les fleurs au printemps et l'été surtout sur les *Crucifères;* quelquefois pendant l'hiver avec *Formica rufa* (ccc), +. Avec le type on rencontre aussi les var. *Coeruleus* (Marsh.), et *Minor* (Reitt.)

Viridescens, F. — Comme le précédent (ccc), +.

Gracilis, Bris. – En fauchant sur les genêts (rr). (Rilly, Merfy.) Quelquefois en secouant des herbes sèches dans les bois. (Thuisy.)

Symphyti, Heer. — Sur les fleurs du *Symphytum officinale* (rr). (Muizon, Germaine.)

Subrugosus, Gyl. — Sur les fleurs du *Sinapis nigra* (r). (Germaine, Muizon, Thuisy.)

Substrigosus, Ea. — Comme le précédent (rrr). (Courcelles.)

Serripes, Gyl. — Sur la sauge et la saponaire (r). (Muizon, Thuisy.)

Obscurus, Er. — En fauchant sur *Mentha aquatiqua* et *Cynoglossum officinale* (r). (Jonchery, Muizon.)

Digitized by Google

Umbrosus, STURM. — Sur les genêts en fleurs (C). (Rilly, Germaine, Merfy.)

Maurus, STURM. — Sur la Sauge (C). (Trigny, Germaine.)

Ovatus, STURM. — Sur les labiées (RR). (Muizon.)

Picipes, STURM. — Au printemps sur les fleurs (CC), +.

Pedicularius, GYLL. — Sur les orties et la sauge (C). (Chigny, Thuisy.)

Erythropus, GYL. — En fauchant sur *Lotus corniculatus* (R). (Rilly.)

Hebes, HEER. — Sur les fleurs dans les bois (RR). (Germaine.) (DEMAISON.)

POCADIUS. — ERICHSON.

Ferrugineus, F. — Dans les lycoperdon (RR). (Berru, Chigny.)

CYCHRAMUS. — KUGELANN.

Luteus, F. — Sur les fleurs des ronces et des sureaux (CC), +. On trouve, mais plus rarement, la var. *Fungicola* (HEER), dans les agarics. (Chigny, Germaine.)

CRYPTARCHA. — SHUCKARD.

Strigata, F. — Dans les plaies humides des chênes; dans les mousses, sous les écorces (RR). (Courcelles, Rilly.)

Imperialis, F. — Comme le précédent (RRR). (Germaine.)

IPS. — FABRICIUS.

4. Punctata, F. — Sous les écorces; parfois au vol (RR) ! (Germaine.)

Digitized by Google

4. Guttata, F. — Sous les écorces; quelquefois au printemps dans la sève coulant des troncs d'arbres abattus récemment (RRR). (Germaine.)

PYTIOPHAGUS. — SCHUCKARD.

Ferrugineus, L. — Sous les écorces des sapins couchés à terre. La larve vit dans les galeries creusées par les Xylophages (RR). (Courcelles, Germaine, Thuisy.)

RHIZOPHAGUS. — HERBST.

Depressus, F. — Sous les écorces des sapins abattus (CC), +.

Cribratus, GYLL. — Comme le précédent (RR). (Merfy.)

Ferrugineus, PAYK. — Comme les précédents (RR). (Thuisy, Châlons-sur-Vesle.)

Perforatus, ER. — Sous les écorces des sapins; quelquefois dans les nids de *Formica rufa* (C), +.

Parallelocollis, GYLL. — Sous les écorces (R). (Merfy, Thuisy.)

Bipustulatus, F. — Sous les écorces, de peuplier principalement (R). (Germaine, Thuisy.)

Politus, HELW. — Sous les écorces d'orme et de chêne (RR). (Germaine.)

TROGOSITIDAE

TROGOSITA. — OLIVIER.

Mauritanica, L. — Cette espèce transportée par le commerce, se trouve quelquefois dans le pain et les farines.

Digitized by Google

THYMALUS. — Duftschmidt.

Limbatus, F. — Espèce citée comme ayant été trouvée par M. de Saint-Marceaux (?)

COLYDIDAE

DIODESMA. — Latreille.

Subterranea, Guer. — En tamisant des mousses recueillies en novembre à Germaine (Bellevoye.)

SARROTRIUM. — Illiger.

Clavicorne, L. — Dans les sablières; en tamisant es feuilles sèches et les lichens (c). (Trigny, Merfy.)

COXELUS. — Latreille.

Pictus, Sturm. — Sous les écorces (rrr). (Germaine.) (Bellevoye.)

BITOMA. — Herbst.

Crenata, F. — Sous les écorces de chêne, de peuplier, de sapin (ccc), +.

AULONIUM. — Erichson.

Sulcatum, Ol. — Sous les écorces d'orme. La larve vit dans les galeries du *Scolytus multistriatus* (rr), +.

Digitized by Google

BOTHRIDERES. — Sturm.

Contractus, F. — Un seul exemplaire trouvé à Pierry par M. Delsuc. Cette rare espèce vit ordinairement sous les écorces de saule et de châtaignier.

CERYLON. — Latreille.

Histeroïdes, F. — Sous les écorces de sapin ou de peuplier; quelquefois avec les fourmis (cc), +.

Angustatum, Er. — Sous les écorces de divers arbres, le peuplier surtout (r) ! (Thuisy.)

CUCUJIDAE

BRONTES — Fabricus.

Planatus, L. — Cette espèce, qui vit sous les écorces de chêne, n'a jamais été capturée dans notre région, mais on l'a trouvée déjà plusieurs fois dans les pays voisins. On la prendra certainement un jour ou l'autre dans la région même.

LAEMOPHLOEUS. — Erichson.

Clematidis, Er. — Sous l'écorce de branches mortes de clématite (rr). (Château des Maretz.) (Warnier.)

SILVANUS. — Latreille.

Frumentarius, F. — Espèce importée dans les grains étrangers.

Advena, Waltl. — Sous les écorces de divers arbres (r) !

Digitized by Google

Bidentatus, F. — Sous les écorce de chêne (R) +.

Unidentatus, F. — Sous les écorces de diverses essences (CC) +.

Similis, ER. — Sous les écorces de sapin (R). (Berru, Cernay, Merfy.)

AERAPHILUS. — REDTENBACHER.

Geminus, KR. — Dans les marais, en tamisant des herbes sèches (CC). (Cormontreuil, Courcelles, Thuisy.)

PSAMMAECHUS. — BOUDIER.

Bipunctatus, F. — Dans les endroits marécageux sous les herbes, les détritus, etc. L'été en fauchant dans les marais (CCC), +.

CRYPTOPHAGIDAE

TELMATOPHILUS. — HEER.

Sparganii, AHR. — Sur *Sparganium ramosum* (RR). (Saint-Imoges.)

Typhae, FALL. — Sur *Typha latifolia* (RR). (Germaine.) (DEMAISON.) ?

Obscurus, F. — Sur les fleurs de *Carex* (R). (Saint-Brice, Muizon.)

Schoenherri, GYL. — En fauchant dans les marais (R). (Muizon, Thuisy.)

ANTHEROPHAGUS. — LATREILLE.

Pallens, L. — Un exemplaire trouvé à Ludes. (BELLEVOYE.)

Digitized by Google

Nigricornis, F. - En fauchant dans les clairières humides (RR). (Germaine.)

CRYPTOPHAGUS. — HERBST.

Lycoperdi, HERBST. — Dans les *Lycoperdon* (C), +.

Setulosus, STURM. — En secouant les vieux fagots en automne (RRR). (Berru.)

Pilosus, GYL. — En tamisant des vieux chaumes (R), +.

Saginatus, STURM. — Dans les vieux tas d'herbe envahis par *Lasius fuliginosus* (R). (Thuisy.)

Scanicus, L. — Dans les endroits humides, en fauchant; en secouant les herbes sèches, etc. (CCC), +.

Badius, STURM. — Dans les détritus végétaux (RRR) !

Cellaris, SCOP. — Dans les celliers et les caves, sous les vieux bois, dans les moisissures des vieux tonneaux, etc. (C), +.

Acutangulus, GYLL. — Dans les détritus végétaux (RR) !

Dentatus, HERBST. — En secouant les vieux chaumes; l'hiver sous les écorces de platane (CC), +.

Distinguendus, STURM. — En secouant les chênes en mai (RR). (Germaine.)

Bicolor, STURM. — En fauchant en été dans les marais (RRR). (Courcelles.)

Pubescens, STURM. — Dans les endroits marécageux en secouant les herbes sèches; dans les nids de guêpe; aussi en compagnie de *Lasius fuliginosus* (RR). (Thuisy, Château des Maretz.)

ATOMARIA. — STEPHENS.

Ferruginea, SAHLB. — Dans les marais sous les herbes envahies par les fourmis (RR). (Taissy.)

Digitized by Google

Umbrina, GYLL. — Dans les détritus d'inondation (R). (Ay.)

Puncticollis, — THOMS. — Comme le précédent (RRR.) (Ay.)

Mesomelas, HERBST. — Dans les endroits marécageux en fauchant, en tamisant les détritus, etc.; quelquefois avec *Formica rufa* (C), +.

Gutta, STEPH. — En secouant les vieux fagots (RRB). (Chigny.)

Rhenana, KR. — Dans les détritus d'inondation (RRR). (Ay.)

Nigripennis, PAYK. — Dans les celliers et dans les caves dans la moisissure des vieux bois (CC), +.

Basalis, ER. — Dans les endroits marécageux en secouant les racines des plantes arrachées au pied des arbres (R). (Thuisy.)

Atra, HERBST. — En secouant les vieux fagots (RR). (Berru.)

Fuscata, SCH. — Dans les endroits humides, au pied des plantes; dans les vieux fagots (R). (Thuisy.)

Apicalis, ER. — Avec *Lasius fuliginosus* (RRR). (Thuisy.)

Atricapilla, STEPH. — Dans les endroits humides sous les herbes sèches; dans les détritus d'inondation. Se trouve aussi en fauchant le soir dans les prairies humides (RR). (Ay, Courcelles, Thuisy.)

Pusilla, PAYK. — En battant les chênes en mai; quelquefois dans les nids de *Formica rufa* (RR). (Germaine, Trigny.)

Analis, ER. — Dans les détritus d'inondation; en secouant. dans les marais, les herbes coupées (RR). (Ay, Thuisy, Courcelles.)

Ruficornis, MARSH. — Dans les détritus végétaux en décomposition; quelquefois au vol autour des fumiers (R). (Rilly, Muizon, Thuisy.)

Digitized by Google

Condensata, Pand. — Espèce des Pyrénées. Un seul exemplaire provenant des marais de Courcelles. Cette espèce avait déjà été capturée à Lille. (Lethierry.)

EPISTEMUS. — Westwood.

Girynoides, Mars. — Dans les matières végétales en décomposition; au vol autour des fumiers (c), +.

Globulus, Payk. — Dans les marais en fauchant, quelquefois en compagnie de *Lasius fuliginosus* (rr). (Thuisy.)

LATHRIDIDAE

LANGELANDIA. — Aubé

Anophthalma, Aubé. — Dans des pieux desséchés enfoncés dans le sol; sous l'écorce des racines mortes (rr) !

ANOMMATUS. — Wesmalë.

Duodecimstriatus, Müll. — Dans des pieux fichés en terre; quelquefois dans les caves sous les vieux morceaux de bois (r) !

LATHRIDIUS. — Illiger.

Lardarius, de Geer. — Sur diverses plantes, surtout sur les légumineuses (rr) !

Angulatus, Manh. — En fauchant; en tamisant les herbes, les feuilles sèches, etc. (rr). (Germaine, Chigny.)

Angusticollis, Hunam. — En battant les vieilles pailles, les lierres (rr) !

Digitized by Google

Nodifer, WESTW. — Sous les herbes sèches. La larve vit de préférence dans les racines de *Crataegus oxyacantha* (CC), +.

Constrictus, GYLL. — Sous l'écorce des arbres morts (RRR) !

Carinatus, GYLL. — Comme le précédent; aussi en tamisant des feuilles et des mousses (RRR) ! (Germaine.)

Elongatus, CURTIS. — Comme le précédent (R). (Chigny.)

Ruficollis, MARSR. — Dans les endroits humides sous les herbes coupées; dans les caves et les celliers sous les vieilles planches (RR). (Muizon.)

Transversus, OL. — Sous les détritus végétaux, les mousses, dans les vieux fagots, etc. (CCC), +.

Minutus, L. — Comme le précédent (CCC), +.

CORTICARIA. — MARSHAM.

Pubescens, ILLIG. — Sous les herbes sèches, les vieux fagots, etc. (C), +.

Impressa, OL. — Dans les marais au pied des joncs; sous les écorces des vieux arbres (RR). (Merfy, Thuisy.)

Fulva, COMOL. — Dans les bergeries; dans les caves sous divers abris (RR) !

Elongata, HUM. — Dans les détritus végétaux; sous les écorces des arbres morts (RR). (Courcelles.)

Gibbosa, HERBST. — Comme le précédent (CC), +.

Transversalis, GYLL. — Comme le précédent (CC), +.

Fuscipennis, MANH. — Espéce méridionale. Un seul exemplaire portant la mention Reims, dans la collection de M. Warnier. (?)

Fuscula, HUM, — Dans les détritus végétaux (R) ! (Muizon.)

Digitized by Google

Distinguenda, Villa. — En tamisant les mousses; en battant les genêts (c), +.

Fulvipes, Comol. — En tamisant des mousses en hiver; Dans les détritus d'inondation (rr) ! (Ay.)

DASYCERUS. — Brongniart.

Sulcatus, Brong. — Dans les mousses, les vieux fagots (rr). (Chigny, Germaine.)

MONOTOMA. — Herbst.

Conicicollis, Aubé. — Dans les nids de *Formica rufa* (c). (Trigny, Châlons-sur-Vesle, Cernay.)

Angusticollis, Gyl. — Comme le précédent (c). (Merfy, Trigny.)

Picipes, Herbst. — Dans les détritus végétaux, parfois au vol autour des fumiers (rr). (Brimont.)

Brevicollis, A. — Dans les fumiers (rr) ! (Ay.)

Quadricollis, A. — Dans les endroits humides, en tamisant des herbes sèches (r). (Thuisy, Muizon.)

MYRMEKIXENUS. — Chevrolat.

Subterraneus, Chev. — Dans les nids de *Formica rufa* (r). (Merfy.)

MYCETAEA. — Stephens.

Hirta, Marsh. — Dans les caves et les celliers, sous les vieux bois (cc), +.

Digitized by Google

SYMBIOTES. — Redtenbacher.

Latus, Redt. — Un seul exemplaire trouvé à Reims (Bellevoye).

Pygmaeus, Hamp. — Dans les nids de *Formica rufa* (rr). (Merfy.)

MYCETOPHAGIDAE

MYCETOPHAGUS. — Helwig.

Quadripustulatus, L. — Dans les bolets; sous les écorces des vieux ormes malades (c), +.

Quadriguttatus, Mull. — Dans les bolets; trouvé une fois en nombre sous un tas d'herbes sèches (rr). (Trigny.)

TRIPHYLLUS. — Latreille.

Punctatus, F. — Dans les bolets (rrr)!

LITARGUS. — Erichson.

Bifasciatus, F. — Sous les écorces de peuplier (cc), +.

TYPHAEA. — Curtis.

Fumata, L. — Dans les endroits humides en tamisant des des herbes sèches (c), +.

Digitized by Google

DERMESTIDAE

BYTURUS. — Latreille.

Fumatus, F. — Sur *Ranunculus bulbosus ;* dans les fleurs des ronces (cc), +.

Tomentosus, de Geer. — Comme le précédent (c), +.

DERMESTES. — Linné.

Frischii, Kug. — Sur les charognes (cc), +.

Undulatus, Brahm. — Comme le précédent, et aussi sous les écorces d'orme (c), +.

Mustelinus, Er. — Sous les détritus végétaux (r). (Muizon.)

Laniarius, Illig. — Dans les détritus d'inondation (r). (Ay.)

Lardarius, L. — Dans les matières animales en décomposition (cc), +.

ATTAGENUS. — Latreille.

Pellio, L. — Sur les fleurs ; dans les habitations où la larve cause quelquefois de grands dégâts dans les lainages, les pelleteries, etc. (ccc), +.

Piceus, Ol. — Comme le précédent (rrr) !

MEGATOMA. — Herbst.

Undata, L. — En battant les vieilles toitures de chaume sous les écorces d'orme et de bouleau (r) ! (Merfy.)

Digitized by Google

HADROTOMA. — Erichson.

Fasciata, Fairm. — Sous les herbes sèches dans les marais (rrr). (Thuisy.)

TIRESIAS. — Stephens.

Serra, F. — Sur les fleurs (rr). (Taissy.)

ANTHRENUS. — Geoffroy.

Scrophulariae, L. — Sur les fleurs, surtout les ombellifères (c), +.

Pimpinellae, F. — Comme le précédent (cc), +.

Varius, F. — Sur les fleurs. C'est cette espèce qui cause des dégâts considérables dans les collections d'histoire naturelle (ccc), +.

Museorum, L. — Sur les fleurs de carotte (c), +.

Claviger, Er. — Sur les fleurs de sureau (r). (Ay, Germaine.)

BYRRHIDAE

NOSODENDRON. — Latreille.

Fasciculare, Ol. — Dans les plaies humides des ormes (c), +.

SYNCALYPTA. — Stephens.

Setosa, Waltl. — Dans les bois sous les vieilles souches ou en secouant les vieux fagots (rr). (Brimont, Berru.)

Spinosa, Rossi. — Dans les détritus d'inondation (r). (Ay.)

Digitized by Google

BYRRHUS. — Linné.

Pilula, L. — Dans les endroits humides, sous les mousses (c), +.

Fasciatus, Ol. — Sous les pierres; sous les mousses des bois (r). (Germaine.)

Dorsalis, F. — Dans les bois de sapin, sous les mousses (r). (Merfy, Cernay.)

Murinus, F. — Sous les mousses dans les bois, surtout dans les forêts de chêne (r). (Chigny, Germaine.)

CYTILUS. — Erichson.

Varius, F. - Dans les bois et les prés humides sous les mousses et les herbes (r). (Muizon, Germaine.)

MORYCHUS. — Erichson.

Nitens, Panz. — Dans les endroits sablonneux; quelquefois au bord des cours d'eau (rr). (Muizon, Ay.)

Semistriata, F. — Au pied des plantes dans les endroits humides; souvent en nombre aux racines des luzernes (c), +.

GEORYSSIDAE

GEORYSSUS. — Latreille.

Pygmaeus, F. — Sur le bord des cours d'eau, dans le sable et la vase (rr). (Thuisy, Ay.)

Digitized by Google

PARNIDAE

PARNUS. — Fabricius.

Prolifericornis, F. — Sous les pierres immergées dans les eaux courantes (c). (Thuisy, Courcelles.)

Luridus, Er. — Au bord des eaux sous divers détritus (c), +.

Lutulentus, Er. — Comme le précédent (r). (Muizon.)

Auriculatus, Panz. — Comme les précédents (rr) ! (Muizon.)

POTAMINUS. — Sturm.

Substriatus, Mull. — Sous les pierres immergées (rr). (Epernay.)

ELMIS. — Latreille.

Toutes les espèces de ce genre se trouvent accrochées après les pierres ou les racines immergées dans l'eau.

Maugeti, Latr. — (rr). (Taissy, Condé-sur-Suippe.)

Obscurus, Mull. — (rr). (Taissy.)

Aeneus, Mull. — (c) ! (Thuisy, Germaine.)

Cupreus, Mull. — (r). (Taissy, Thuisy, Condé-sur-Suippe.)

Wolkmari, Mull. — (rr). (Taissy, Condé-sur-Suippe.)

Parallelipipedus, Mull. — (rrr). (Taissy.)

Tuberculatus, Mull. — (cc), +.

HETEROCERIDAE

HETEROCERUS. — Fabricius.

Laevigatus, Panz. — Dans les détritus d'inondation (rr). (Ay.)

Digitized by Google

PECTINICORNES

LUCANUS. — Linne.

Cervus, L. — Dans les bois de chêne (RRR). (Germaine, Merfy, Trigny.)

DORCUS. — Mac Leay.

Parallelipipedus, L. — Dans les vieux troncs d'arbre, de préférence dans les endroits sablonneux (R). Trigny, Merfy.)

PLATYCERUS. — Geoffroy.

Caraboides, L. — Dans les forêts sur les troncs d'arbre; souvent au vol (C), +.

SINODENDRON. — Helwig.

Cylindricum, L. — Dans le terreau des vieux troncs d'arbre (RR), +.

Digitized by Google

LAMELLICORNES

COPRIDAE

GYMNOPLEURUS. – ILLIGER.

Cantharus, ER. – Dans les endroits arides (C), (Cernay, Mourmelon.)

SISYPHUS. – LATREILLE.

Schaefferi, L. — Dans les endroits arides exposés au midi, surtout sur les coteaux (C). (Berru, Moronvillers, Mourmelon.)

COPRIS. — GEOFFROY.

Lunaris, L. — Dans les bois (RR). (Merfy.)

ONTOPHAGUS. — LATREILLE.

Taurus, L. — Dans les bouses (RR). (Germaine, Berru.)

Vacca, L. — Dans les déjections animales (R), +.

Coenobita, HERBST. — Comme le précédent (C), +.

Fracticornis, F. – Comme les précédents (CC), +.

Nuchicornis, L. — Mêmes mœurs (CC), +.

Digitized by Google

Lemur, F. — Comme les précédents, de préférence dans les crottins de brebis (C), +.

Ovatus, L. — Comme les précédents (CCC), +

APHODIDAE

COLOBOPTERUS. — MULSANT.

Erraticus, L. — Dans les crottins, les bouses, etc. (C) ! (Germaine).

COPRIMORPHUS. — MULSANT.

Subterraneus, L. — Dans les crottins de brebis (CC), +.

TEUCHESTES. — MULSANT.

Fossor, L. — Dans les bouses (R) ! (Germaine, Merfy.)

APHODIUS. — ILLIGER.

Scybalarius, F. — Dans les endroits sablonneux, dans les crottins (RR). (Trigny, Châlons-sur-Vesle.)

Fimetarius, L. — Dans les bouses, les crottins, etc. (CCC), +.

Granarius, L. — Comme le précédent (CC), +.

Foetidus, F. — Dans les bouses des ruminants (RRR). (Germaine.)

Putridus, STURM. — Un seul exemplaire trouvé à Ay dans des détritus d'inondation.

Sordidus, F. — Dans les crottins (RRR) ! (DEMAISON.)

Lugens, CREUTZ. — Dans les bouses (C), +.

Nitidulus, F. — Dans le crottin de cheval (C), +.

Digitized by Google

Immundus, CREUTZ. — Comme le précédent (RR). (Thuisy.) (BELLEYOYE.)

Varians, DUFT. — Dans les crottins; quelquefois sous les cadavres des animaux (RR). (Ay, Germaine.)

Inquinatus, HEBBST. — Dans les bouses, les crottins, les excréments (CC), +.

Melanostictus, SCHM. — Dans le crottin de cheval (C), +.

Sticticus, PANZ. — Dans les bois, dans les crottins (R). (Rilly, Germaine.)

Conspurcatus, L. — Trouvé à Reims par M. Demaison.

Pictus, STURM. — Dans le crottin de cheval (RR). (Cernay, Berru.)

Tessulatus, PAYK. — Dans les bouses, les crottins, etc. (C), +.

Porcus, F. — Dans les crottins de brebis (RRR). (Thillois).

Pusillus, HERBST. — Comme le précédent (RR) ! (DEMAISON.)

Quadrimaculatus, L. — Dans les bouses (C), +.

Biguttatus, GERM. — Comme le précédent (RR). (Germaine.)

Merdarius, F. — Dans les bouses, les crottins, etc. (CC), +.

Prodromus, BRAHM. — Comme le précédent (CCC), +.

Consputus, F. — Mêmes mœurs (CC), +.

Contaminatus, HERBST. — Dans les crottins de chevaux (C), +.

Rufipes, L. — Dans les bouses des ruminants (RR). (Germaine.) La var. *gagates*, MÜLL., semble moins rare que le type.

PLAGIOGONUS. — MULSANT.

Arenarius, OL. — Dans les endroits sablonneux, dans les crottins (RR) ! (Bazancourt.)

Digitized by Google

HEPTAULACUS. – MULSANT.

Sus, HERBST. — Dans le crottin de cheval (RR). (Cernay, Thuisy.)

Testudinarius, F. — Dans les fumiers desséchés (RR) ! (Germaine.)

OXYOMUS. – DE CASTELNAU.

Porcatus, F. – Dans les détritus végétaux, les déjections animales, souvent au vol (CC), +.

AMMOECIUS. — MULSANT.

Brevis, ER. — Dans les bouses et les fumiers desséchés, de préférence dans les endroits sablonneux (RR) ! (Thuisy.)

PSAMMOBIUS. — HEER.

Caesus, PANZ. — Dans les détritus végétaux; souvent le soir au vol (CC), +.

Sabulosus, MULS. — Dans les sablières, sous les pierres et divers abris (RR). (Châlons-sur-Vesle, Berru.)

Sulcicollis, ILLIG. — Comme le précédent (R). (Merfy, Trigny.)

GEOTRUPIDAE

ODONTAEUS. — KLUG.

Mobilicornis, F. — Cette espèce se trouve ordinairement enfoncée en terre sous les bouses, les crottins de brebis. Elle vole le soir (RRR). (Germaine, Courtagnon.)

Digitized by Google

GEOTRUPES. — Latreille.

Typhaeus, L. — Dans les bouses et les crottins (R), +.

Stercorarius, L. — Comme le précédent (C). +.

Spiniger, Marsh. — Comme les précédents (CC), +.

Mutator, Marsh. — Comme les précédents (CC), +.

Hypocrita, Illig. — Mêmes mœurs (C), +.

Sylvaticus, Panz. — Quelquefois sous les bouses, mais plus généralement dans les bois sous les mousses (CC), +.

Vernalis, L. — Dans les bouses (CC), +.

TROGIDAE

TROX. — Fabricius.

Perlatus, Scriba. — Dans les terrains secs et sablonneux, sous les matières animales desséchées, ou se cachant sous des morceaux de bois, d'étoffe, etc. (C), +.

Sabulosus, L. — Mêmes mœurs (R), +.

Scaber, L. — Comme les précédents, quelquefois le soir au vol (C), +.

MELOLONTHIDAE

HOPLIA. — Illiger.

Philanthus, Subr. — Sur les saules, quelquefois au vol (RR), +.

Digitized by Google

Farinosa, L. — Sur l'églantier, parfois sur le saule (RRR). (Muizon.)

HOMALOPLIA. - Stephens.

Ruricola, F. — Sur les graminées; au vol dès neuf heures du matin (C). (Cernay, Muizon, Nogent-l'Abbesse.)

SERICA. — Mac Leay.

Holosericea, Scop. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres ou courant à terre (R). (Châlons-sur-Vesle, Merfy.)

Brunnea, L. — Sur les ronces et les églantiers (RR)! (Germaine.)

RHIZOTROGUS. — Latreille.

Aestivus, Ol. — Courant à terre dans les endroits secs; le soir au vol (C), +.

Cicatricosus, Muls. — Ordinairement enfoncé en terre, ne sortant que vers le soir (RR). (Merfy.)

S. g., *Amphimallus*. (Latreille.)

Fuscus, Scop. — Volant dès cinq heures du matin en été et se reposant par instant sur les plantes, les graminées de préférence (CC), +.

Solstitialis, L. — Dans les endroits sablonneux, vole le soir et quelquefois en plein midi au dessus des prés et des champs. La larve produit de grands dégâts et est souvent confondue avec celle de *Melolontha vulgaris* (CC), +.

Ochraceus, Knoch. — Dans la matinée au vol, l'après-midi sur les plantes (R), +.

Rufescens, F. — Vole le soir; ronge les gazons et les plantes herbacées (R). (Merfy, Germaine.)

Digitized by Google

MELOLONTHA. — Fabricius.

Vulgaris, F. — Sur les arbres, les buissons, etc. (ccc), +.
Hippocastani, F. — Avec le précédent, mais très localisé (cc). (Châlons-sur-Vesle, Merfy, Trigny.)

ANOMALIDAE

ANISOPLIA. — Castelnau.

Agricola, F. — Sur les graminées, surtout les bromides (rr). (Châlons-sur-Vesle.)

ANOMALA. — Samouelle.

Aenea, de Geer. — Sur les saules, quelquefois dans les bois sablonneux le matin au vol (r). (Tinqueux, Merfy.)

PHYLLOPERTHA. — Stephens.

Horticola, L. — Sur les gazons, plus souvent sur les arbres, de préférence les arbres fruitiers (cc), +. On trouve aussi, mais très rarement, la var. *Ustulatipennis*. Villa. (Thuisy, Rilly.)

ORYCTIDAE

ORYCTES, — Illiger.

Nasicornis, L. — Dans le tan des tanneurs, les couches des jardins, etc. (cc), +.

Digitized by Google

CETONIDAE

OXYTHYREA. — Mulsant.

Stictica, L. — Sur les arbustes en fleurs. Cet insecte commet de grands dégâts sur les arbres fruitiers dont il ronge les fleurs (cc), +.

TROPINOTA. — Mulsant.

Hirtella, L. — Sur les fleurs (rrr). (Auberives.) (Ninin.)

CETONIA. — Fabricius.

Aurata, L. — Sur les fleurs (ccc), +.

Floricola, Herbst. — Sur les fleurs; trouvée en nombre sur des *Thalictrum* et sur *Clematis vitalba* (r) ! (Fismes, Boult-sur-Suippe.)

Marmorata, F. – Dans les mêmes conditions que la précédente (rrr) !

GNORIMUS. — Serville.

Nobilis, L. — Sur les fleurs de sureau; quelquefois dans le terreau de divers arbres (rr). (Rilly, Germaine.)

TRICHIUS. — Fabricius.

Fasciatus, L. — Sur les fleurs (rr). (Rethel, Laifour.)

Abdominalis, Men. — Comme le précédent (cc), +.

VALGUS. — Scriba.

Hemipterus, L. — Dans le bois pourri, surtout le bois de saule ou de chêne (cc), +.

Digitized by Google

STERNOXES

BUPRESTIDAE

ANTHAXIA. — Eschscholtz.

Manca, F. — En fauchant sur les plantes dans les endroits humides (RRR). (Ay.)

Nitidula, L. — Sur les arbrisseaux en fleurs dans les bois (R). (Rilly, Germaine.)

Quadripunctata, L. — Dans les endroits marécageux, sur les fleurs, surtout sur *Caltha palustris* et *Taraxacum officinale* (RR). (Tinqueux, Muizon.)

AGRILUS. — Solier.

Sinuatus, Ol. — Sur les feuilles de *Crataegus oxyacantha* (RRR). (Germaine.)

Subauratus, Gebl. — Sur le chêne et le tremble (RRR). (Rilly.)

Viridis, L. — Sur le hêtre et le bouleau (C), +.

Caeruleus, Rossi. — Sur le chêne, l'aulne, le bouleau (R), +.

Pratensis, Ratz. — Sur le tremble et le chêne (RR). (Rilly, Germaine.)

Tenuis, Ratz. — Sur les jeunes pousses de chêne (R). (Rilly.)

Digitized by Google

Angustulus, Illig. — Sur le chêne (c). (Verzy, Rilly.)

Laticornis, Illig. — Comme le précédent (rr). (Germaine.)

Olivicolor, Kiesw. — Sur divers arbrisseaux (rr). (Rilly.)

Cinctus, Ol. — Sur les genets (r). (Rilly.)

TRACHYS. — Fabricius.

Minuta, L. — Sur divers arbres, le chêne et le saule de préférence (c), +.

Troglodytes, Gyll. — Un seul exemplaire trouvé par M. Follias, à Ludes, en battant des buissons.

Nana, Herbst. — Sur *geranium sanguineum* et *convolvulus arvensis*(rrr). (Trigny, Châlons-sur-Vesle.

APHANISTICUS. — Latreille.

Pusillus, Ol. — Dans les marais sur les joncs (r). (Thuisy, Courcelles.)

THROSCIDAE

THROSCUS. — Latreille.

Dermestoides, L. — En secouant les vieux fagots (c), +.

Elateroides, Heer. — Sur *parietaria officinalis* (rr). (Thuisy.)

Obtusus, Curt. — Sous les feuilles sèches (rr). (Thuisy, Courcelles.)

EUCNEMIDAE

MELASIS. — Olivier.

Buprestoides, L. — Sur le chêne et le hêtre (rrr). (Thuisy.)

Digitized by Google

EUCNEMIS. — Ahrens.

Capucinus, Ahr. — Sous les écorces de divers arbres; hêtre, peuplier, tilleul, etc. (rrr)! (Tinqueux, Germaine.)

ELATERIDAE

LACON. — Castelnau

Murinus, L. — Dans les prairies sur les fleurs, souvent au vol (ccc), +.

ELATER — Linné.

Sanguinolentus, Schr. — Sur les arbustes en fleur; de préférence sur les arbres fruitiers (rrr). (Boult-sur-Suippe.)

Pomonae, Steph. — Comme le précédent (rrr)!

Pomorum, Geoff. — Sur l'aubépine (rr). (Châlons-s-Vesle.)

Crocatus, Geoff. — Dans le terreau des saules; quelquefois sur l'aubépine (r)! (Merfy.)

Elongatulus, Ol. — Sur les arbrisseaux en fleur (r). (Courcelles.)

Balteatus, L. Comme le précédent (rr). (Cormontreuil.)

MEGAPENTHES. Kiesenwetter.

Tibialis, Lac. — Dans le terreau des vieux arbres (rrr). (Châlons-sur-Vesle.)

CRYPTOHYPNUS. — Eschsholtz.

Pulchellus, L. — Dans les graviers au bord des cours d'eau (rr). (Ay.)

Digitized by Google

Tetragraphus, GERM. — Comme le précédent (R). (Ay.)

CARDIOPHORUS. — ESCHSCHOLTZ.

Thoracicus, F. — Sur les fleurs (RRR). (Muizon).

Rufipes, FOURC. — Sur l'aubépine en fleur (RR). (Laifour.)

Vestigialis, ER. — Comme le précédent (R). (Germaine.)

Musculus, ER. — Au printemps sur les sapins (R). (Merfy.)

Cinereus, HERBST. — Sur les arbrisseaux en fleur (C). (Germaine, Merfy.)

Equiseti, HERBST. — Dans les prairies humides sur les fleurs (R). (Muizon.)

MELANOTUS. — ESCHSCHOLTZ.

Niger, F. — Dans les endroits sablonneux sur les fleurs (R). (Châlons-sur-Vesle, Merfy, Trigny.)

Rufipes, HERBST. — Sous les écorces de chêne, de saule, de hêtre, de bouleau (RR). (Merfy, Germaine, Thuisy.)

LIMONIUS. — ESCHSCHOLTZ.

Nigripes, GYL. — Dans les endroits marécageux en fauchant sur les plantes (C), +.

Cylindricus, PAYK. — Sur les sapins (C). (Germaine, Merfy.)

Parvulus, PANZ. — Sur l'aubépine en fleur (C). (Rilly, Germaine.)

ATHOUS. — ESCHSCHOLTZ.

Rhombeus, OL. — Sous les écorces de saule (RRR) (Muizon.)

Niger, L. — Sur les arbrisseaux; dans les prairies sur les fleurs (CC), +.

Digitized by Google

Haemorrhoidalis, F. — Comme le précédent (cc), +.

Vittatus, F. — Sur le chêne, le tremble, etc. (cc), +.

Longicollis, Ol. — Sur les arbustes; dans les marais en fauchant (cc), +.

Subfuscus, Mull. - Sur le chêne et le bouleau (rr). (Germaine.)

CORYMBITES. — Latreille.

Haematodes, F. — Dans les bois de chêne (c). (Germaine, Rilly.)

Castaneus, L. — Sur les sapins; en fauchant sur les ombellifères (rr)! (Merfy.)

Tesselatus, F. — Dans les bois humides sur les arbustes ; quelquefois en fauchant dans les marais (r). (Thuisy, Muizon, Germaine.)

Affinis, Payk. — Espèce des régions montagneuses, trouvée à Reims par M. Warnier, vraisemblablement importée.

Holosericeus, F. — Sur les sapins en fleur (cc), +.

Metallicus, Pabk. — Dans les bois ombragés, sur les pousses de chêne, de bouleaux, de coudrier (rrr). (Germaine.)

Latus, F. — En fauchant dans les prairies humides (cc), +.

Bipustulatus, L. — Sous les mousses et les écorces, dans les bois de chêne (rr). (Rilly, Germaine.)

Cinctus, Payk. — Dans le terreau des saules, des chênes, des hêtres (rrr). (Rilly.)

Cruciatus, L. — Sur le chêne et le coudrier (rr). (Germaine.)

LUDIUS. — Latreille.

Ferrugineus, L. — En juin et juillet, dans le terreau des saules (rr). (Muizon, Merfy.)

Digitized by Google

AGRIOTES. — Eschsholtz.

Pilosus, Panz. — Dans les bois, sur les arbustes (c), +.
Ustulatus. Schal. — Dans les endroits humides, sous les herbes, les détritus; souvent sur les fleurs (cc), +.
Sputator, L. — Comme le précédent (cc), +.
Lineatus, L. — Comme les précédents (cc), +.
Obscurus, L. — Comme les précédents (cc), +.
Aterrimus, L. — Dans les bois, sur les buissons (c), +.
Sobrinus, Kiesw. — Dans les endroits humides, sur les fleurs (rr). (Germaine.)
Pallidulus, Illig. — Sur les buissons en fleur (r). (Germaine.)
Gallicus, Cast. — Dans les endroits humides, sur les graminées et les ombellifères (r). (Rilly, Muizon).

DOLOPIUS. — Eschsholtz.

Marginatus, L. — Sur les fleurs, les arbustes, etc. (c), +.

SYNAPTUS. — Eschsholtz.

Filiformis, F. — Dans les bois humides, sur les arbres, surtout sur les aulnes (c), +.

ADRASTUS. — Eschsholtz.

Limbatus, F. — Dans les endroits marécageux, sur les joncs, les herbes, etc.; quelquefois aussi sur les buissons (r), +.
Nitidulus, Marsh. — Sur les aulnes, dans les endroits humides (r)!
Rachifer, Fourc. — Sur les aulnes, les orties (r). (Germaine, Merfy.)
Linearis, L. — Sur les aulnes; quelquefois au vol (rrr). (Germaine.)

Digitized by Google

MALACODERMES

DASCILLIDAE

DASCILLUS. — Latreille.

Cervinus, L. — En battant les arbustes, surtout les conifères; en fauchant sur les fleurs, de préférence sur les ombellifères (RR). (Rethel, Marais de Sillery.)

HELODINAE

HELODES. — Latreille.

Minutus, L. — En fauchant dans les endroits humides (C). (Thuisy, Muizon.)

Marginatus, F. — Sous les herbes coupées dans les marais (CC). (Muizon.)

MICROCARA. — Thomson.

Testacea, L. — En fauchant dans les prairies humides; quelquefois sur les saules; en mai et juin (R). (Germaine, Muizon.)

Digitized by Google

CYPHON. — Paykull.

Coarctatus, Payk. — En fauchant dans les endroits humides; pendant l'hiver, dans les mousses des arbres (rr) ! (Berru.)

Padi, L. — Dans les endroits humides, en fauchant sur les herbes, en secouant des détritus végétaux (cc), +.

Variabilis, Thunb. — Comme le précédent (cc), +.

Paykulli, Guer. — Comme les précédents (c), +.

SCIRTES. — Illiger.

Hemisphaericus, L. — Dans les endroits marécageux sur les joncs, les roseaux, les arbustes (cc), +.

EUBRIA. — Latreille.

Palustris, Germ. — Au bord des mares et des ruisseaux sur les plantes aquatiques (rrr). (Chamery.)

LAMPYRIDAE

LAMPYRIS. — Geoffroy.

Noctiluca, Lin. — Le soir dans les endroits boisés. On trouve souvent les ♂ dans le voisinage des ♀. On peut encore se procurer facilement des ♂ en étendant, le soir à la nuit close, une nappe en vue de la lisière d'un bois et en y plaçant quelques ♀ ou simplement en y posant une lumière (c), +.

Digitized by Google

PHOSPHAENUS. — Castelnau.

Hemipterus, Fourc. — ♂ à terre ou en fauchant très près du sol sur le gazon (c), +; ♀ qui est excessivement rare ne se rencontre que par hasard; on ne connaît pas les mœurs de cette espèce.

LYCIDAE

OMALISUS. — Geoffroy.

Suturalis, F. — En fauchant dans les bois sur les graminées; quelquefois en battant les arbustes (c.) (Germaine.)

DRILIDAE

DRILUS. — Olivier.

Flavescens, Fourc. — ♂ dans les bois, en fauchant ou en battant les haies et les arbres (cc) +. La ♀ s'obtient assez facilement en recueillant au printemps le long des haies ou dans les bois des helix de diverses espèces et en les mettant dans des vases recouverts d'une vitre et que l'on visite de temps à autre.

TELEPHORIDAE

TELEPHORUS. — Schaeffer.

Violaceus, Payk. — En battant les sapins; en fauchant sur les orties et les ombellifères (rr). (Taissy, Merfy.)

Digitized by Google

Annularis, MEN. — Au printemps, sur les fleurs et les buissons (RR). (Trigny, Germaine.)

Fuscus, L. — Comme le précédent (CCC), +.

Rusticus, FALL. — Comme les précédents (CCC), ±.

Obscurus, L. — Comme les précédents (CCC), +.

Pulicarius, F. — Sur les fleurs, les arbustes, surtout sur l'aubépine (R) ! (Germaine, Merfy, Brimont.)

Nigricans, MÜLL. — En mai et juin, sur les fleurs (C), +.

Pellucidus, F. — Sur les buissons (R). (Germaine, Rilly, Merfy.)

Lividus, L. — En battant les peupliers, les chênes, les sapins; sur les graminées, les ombellifères, etc. (CCC), +. Avec le type se trouve, mais un peu moins communément, la var. *dispar*, F.

Figuratus, MANH. — Sur les plantes et les buissons dans les bois humides (RR). (Germaine.)

Bicolor, PANZ. — Dans les prés et les bois, sur les fleurs et les buissons (CC) +.

Fulvicollis, F. — Sur les plantes, dans les endroits marécageux (R). (Rilly, Muizon, Trigny.)

Thoracicus, OL. — Sur les plantes, les buissons, etc., au bord des eaux (RR). (Damery, Ay.)

Lateralis, SCHR. — En fauchant dans les bois et les prairies humides (R) ! (Thuisy.)

Haemorrhoidalis, F. — En battant les haies, les buissons; en fauchant sur les fleurs dans les prairies (C), +.

RHAGONYCHA. — ESCHSHOLTZ.

Translucida, KRYN. — Sur les sapins et les bouleaux (RR). (Rilly.)

Digitized by Google

Fuscicornis, Ol. — Sur les chênes et les sapins (rr). (Germaine.) (Demaison.)

Fulva, Scop. — Sur les ombellifères, les graminées, etc. (ccc), +.

Testacea, L. — Sur les chênes et les saules; en fauchant dans les clairières des bois (rr). (Germaine, Thuisy.)

Limbata, Thoms. — Comme le précédent (c), +.

Pallida, F. — Sur les bouleaux, les chênes, les sapins; en fauchant sur les ombellifères (c), +.

Elongata, Fallen. — Sur les buissons; en fauchant dans les clairières (c). (Rilly, Germaine.)

SILIS. — Latreille.

Ruficollis, F. — Dans les marais, sur les joncs, les roseaux, etc. (pr). (Courcelles, Thuisy.)

Nitidula, F. — Sur *vaccinium myrtillus* (rrr). (Germaine.) (Bellevoye.)

MALTHINIDAE

MALTHINUS. — Latreille.

Punctatus, Fourc. — En battant les chênes, les coudriers, les bouleaux (c). (Germaine, Merfy, Berru.)

Fasciatus, Ol. — Comme le précédent (c). (Germaine.)

MALTHODES. — Kisenwetter.

Ruficolis, Latr. — Sur le chêne et le noisetier; quelquefois sur les ombellifères (r). (Berru, Cernay.)

Marginatus, Latr. — Sur divers arbustes : chênes, sureaux, etc. (r). (Germaine.)

Digitized by Google

Dispar, Germ. — En fauchant dans les endroits marécageux (rr). (Thuisy.) (Bellevoye.)

Trifurcatus, Kiesw. — En battant les sapins et autres conifères (rr). (Trigny.)

MALACHIDAE

MALACHIUS. — Fabricius.

Viridis, F. — Sur les graminées (cc), +.

Elegans, Ol. — Comme le précédent (rr). (Thuisy.)

Bipustulatus, L. — Comme les précédents (cc), +.

Aeneus, L. — Sur les graminées, principalement dans les blés (cc), +.

Marginellus, Ol. — Sur les fleurs dans les prairies humides (cc), +.

ANTHOCOMUS. — Erichson.

Sanguinolentus, F. — Sur les joncs, dans les marais (c). (Thuisy, Muizon.)

Equestris, F. — Sur les buissons, les fleurs, etc., souvent au vol (cc), +.

Fasciatus, L. — Sur les arbustes, les fleurs, etc. (cc), +.

CERAPHELES. — Mulsant.

Terminatus, Men. — Sur *Iris pseudo-acorus* (rr). (Thuisy.)

AXINOTARSUS. — Motschulsky.

Ruficollis, Ol. — Sur les fleurs, dans les endroits marécageux (r). (Courcelles, Thuisy, Warmeriville.)

Digitized by Google

Pulicarius, F. — Comme le précédent (c). (Muizon, Courcelles, Cormontreuil.)

EBAEUS. — Erichson.

Thoracicus, Ol. — Sur les fleurs (cc), +.

Pedicularius, Schr. — Dans les endroits humides sur les fleurs (rr). (Thuisy.)

HYPHEBAEUS. — Kiesenwetter.

Albifrons, F. — Sur le lierre (rrr). (Ludes.) (Bellevoye.)

Flavipes, F. — Comme le précédent (c) ! (Pévy, Trigny.)

CHAROPUS. — Erichson.

Pallipes, Ol. — Dans les endroits humides, sur les fleurs, sous les herbes coupées, etc. (cc), +.

DASYTIDAE

DASYTES. — Paykull.

Coxalis, Muls. — Sur le troene en fleur (c) ! (Germaine.)

Plumbeus, Illig. — Dans les prairies, sur les fleurs (c) +.

Coeruleus, F. — Sur les sapins. — Je l'ai trouvé une fois en nombre dans des branches de chêne à moitié pourries (c). (Merfy, Germaine.)

Fusculus, Illig. - Sur les fleurs (r) (Germaine.)

Subaeneus, Sch. — Dans les endroits secs, sur les plantes (c) !

Digitized by Google

DOLICHOSOMA. — Stephens.

Lineare, Rossi. — Dans les endroits ombragés, sur les herbes (R) (Germaine.)

PSILOTHRIX. — Redtenbacher.

Nobilis, Illig. — Sur les fleurs (C), +.

HAPLOCNEMUS. — Stephens.

Pini, Redt. — Sur les sapins (C). (Merfy, Berru, Trigny.)

Nigricornis, F. — Comme le précédent (C). (Merfy, Berru.)

Virens, Suff. — Sous les écorces de divers arbres (RR). (Germaine.) (Bellevoye.)

Ahenus, Kiesw. — Sur les sapins ; souvent sous les écorces (RR) ! (Demaison.)

DANACAEA. — Castelnau.

Longiceps, Muls. — Sur les fleurs (RR). (Germaine.) (Warnier.)

Nigritarsis, Kust. — Sur les fleurs, surtout sur le liseron (CC), +.

Digitized by Google

TEREDILES

CLERIDAE

TILLUS. — Olivier.

Elongatus, L. — Sur les fleurs, quelquefois sous les écorces (RR) !

Unifasciatus, Charp. — 2 exemplaires trouvés en ville par M. Bellevoye.

OPILUS. — Latreille.

Domesticus, Sterm. — Dans les habitations; la larve vivant dans les bois. (RR) !

CLERUS. — Geoffroy.

Formicarius, L. — Sous les écorces, les mousses, dans les vieux fagots, etc. (CC), +.

Quadrimaculatus, F. — Sous les écorces des sapins et autres conifères (RR). Thuisy, Trigny, Hermonville.)

TARSOSTENUS. — Spinola.

Univittatus, Rossi. — Dans les vieux osiers (RR) !

Digitized by Google

TRICHODES. — Herbst.

Alvearius, F. — Sur les fleurs (cc), +.

Apiarius, L. — Comme le précédent (cc), +.

CORYNETES. — Herbst.

Coeruleus, Deg. — Dans les vieux bois : quelquefois sur les fleurs (cc), +.

NECROBIA. — Latreille.

Ruficollis, F. — Dans les matières animales en putréfaction (cc), +.

Violacea, L. — Comme le précédent (cc), +.

Rufipes, Deg. — Comme les précédents (c), +.

HYLECOETIDAE

HYLECOETUS. — Latreille.

Dermestoides, L. — Dans les vieux bois, principalement de chêne, de bouleau, de sapin (rrr) ! M. Bellevoye a trouvé la var. *morio*, F. dans les chantiers de bois du port. Il a trouvé dans les mêmes conditions l'espèce suivante :

Flabellicornis, Schn. — (rrr) !

SINOXYLIDAE

APATE. — Fabricius.

Capucina, L. — Dans les vieux bois; souvent sur les tas d'échalas dans les vignes (r). (Verzy, Rilly, Avize.)

Digitized by Google

LYCTIDAE

LYCTUS. — Fabricius.

Canaliculatus, F. — Dans les vieux bois, sous les écorces, les mousses, etc. (cc), +.

CIIDAE

Toutes les espèces de cette tribu se trouvent dans les champignons et les bolets.

Boleti, Scop. — (cc), +.
Plagiatus, Thoms. — (c),+.
Micans, F. — (r) ! (Thuisy.)
Hispidus, Payk, — (c) ! (Berru, Rilly.)
Comptus, Gyll. — (rr). (Thuisy.)
Laminatus, Mell. — (c) ! (Thuisy.)
Castaneus, Mell. — (c) ! (Trigny.)
Oblongus, Mell. — (rr) !

RHOPALODONTUS. — Mellié.

Fronticornis, Panz. — (rr). (Château des Maretz.)

ENNEARTHRON. — Mellié.

Affine, Gyll. — (cc), +.
Cornutum, Gyll. — (rr) ! (Bazancourt.)

OCTOTEMNUS. — Meillé.

Glabriculus, Gyll. — (R). (Muizon, Courcelles.)

Digitized by Google

ANOBIDAE

DRYOPHILUS. — Chevrolat.

Pusillus, Gyll. — Sur les sapins; quelquefois sur le chêne (rrr). (Rilly, Germaine.)

ANOBIUM. — Fabricius.

Striatum, Ol. — Sur le hêtre et le sapin (r). (Verzy, Rilly.)

Fulvicorne, Sturm. — Sur les sapins (c), +.

Nitidum, Herbst. — Dans les vieux bois (rr) !

Rufipes, F. — Comme le précédent (r) !

Paniceum, L. — Dans les bois de charpente (c , +.

XESTOBIUM. — Motschulski.

Tesselatum, F. - Dans les vieux bois (c), +.

ERNOBIUS. — Thomson.

Abietis. F. — Dans le bois de sapin (rrr) !

GASTRALLUS. — Jacquelin du Val.

Laevigatus, Ol. — Sur le chêne et le sapin (rrr). (Pévy.)

PTILINUS. — Geoffroy.

Pectinicornis, L. - Dans les vieux bois (cc), +.

OCHINA. — Stephens.

Hederae, Müll. - En battant les lierres (cc), +.

Digitized by Google

XYLETINUS. — Latreille.

Ater, Panz. — Dans le vieux bois (rrr). (Rilly.)

LASIODERMA. — Stephens.

Haemorrhoidalis, Illig. — Trouvé à Guignicourt en battant une haie (rrr). (Bellevoye)

DORCATOMA. — Herbst.

Dresdensis, Herbst. — Dans les bolets (rr). (Warmériville.)

ASPIDIPHORUS. — Latreille.

Orbiculatus, Gyll. — Dans les champignons (rrr) (Taissy.) (Warnier.)

PTINIDAE

HEDOBIA. — Latreille.

Imperialis, L. — Dans le tilleul (rr) !

PTINUS. — Linné.

Dubius, Sturm. — Sur les sapins (cc), +.

Sexpunctatus, Panz. — Dans les vieux bois (rr). (Rilly.)

Ornatus, Müll. — En battant les haies en juin (rr). (Guignicourt.) (Bellevoye.)

Rufipes, Ol. — Dans le bois de chêne (rr). (Taissy.) (Warnier.)

Digitized by Google

Fur, L. — Cette espèce, qui vit de matières animales, cause de grands dégâts dans les collections d'histoire naturelle (CC), +.

Pusillus, STURM. — Dans les vieux bois de charpente (R) ! (Chigny.)

Bicinctus, STURM. — Comme le précédent (RR) !

Latro, F. — Au printemps, dans les habitations.

Brunneus, DUFT. — Comme le précédent (R), +.

Subpilosus, STURM. — Comme les précédents (R) !

Raptor, STURM. — Dans les vieilles charpentes (RRR). !

NIPTUS. — BOIELDIEU.

Crenatus, F. — Sous les écorces (RR). (Merfy.)

GIBBIUM. — SCOPOLI.

Scotias, F. — Dans les habitations; la larve vit dans les fourrures, les lainages, etc. (R) +.

Digitized by Google

TENEBRIONIDES

BLAPTIDAE

BLAPS. — Fabricius.

Similis, Latr. — Dans les endroits sombres et humides, caves, celliers, etc., sous divers abris (c) +.

Mucronata, Latr. — Comme le précédent (cc) +.

ASIDIDAE

ASIDA. — Latreille.

Grisea, Ol. — Sous les pierres dans les endroits sablonneux surtout (cc) +.

CRYPTICIDAE

CRYPTICUS. — Latreille.

Quisquilius, L. — Sous les pierres dans les endroits sablonneux (cc) +.

Digitized by Google

OPATRIDAE

OPATRUM. — Fabricius.

Sabulosum, L. – Dans les endroits sablonneux sous les pierres (cc) +.

MICROZOUM. — Redtenbacher.

Tibiale, F. - Sous les pierres dans les endroits sablonneux recouverts de gazon (cc) +.

DIAPERIDAE

DIAPERIS. — Geoffroy.

Boleti, L. — Dans les bolets (r) +.

PLATYDEMA. — Castelnau.

Violacea, F. — Dans les mousses qui croissent sur les arbres (cc). (Germaine.)

TRIBOLIUM. — Mac Leay.

Confusum, Duv. — Dans les substances alimentaires farineuses (rr) !

ALPHITOBIUS. — Stephens.

Piceus, Ol. — Trouvé une seule fois à terre dans la ville. (Bellevoye.)

HYPOPHLOEUS. — Fabricius.

Bicolor, Ol. — Sous les écorces et dans le terreau des vieux arbres (c +.

Digitized by Google

Depressus, F. — Sous les écorces (RR) !

Linearis, F. — Comme le précédent (RRR). (Mont-Bernon.) (BELLEVOYE.)

TENEBRIONIDAE

TENEBRIO. — LINNÉ.

Molitor, L. — Dans les moulins, les greniers à farine, etc. La larve vit dans les farines et s'appelle vulgairement *ver de farine* (CC) +.

Obscurus, F. — Dans les greniers à blé (RR) +.

HELOPIDAE

HELOPS. — FABRICIUS.

Lanipes, L. — Sous la mousse au pied des arbres (CC). (Germaine, Rilly, Merfy, Berru.) La larve a déjà été trouvée dans les vignes parmi les racines des ceps.

CISTELIDAE

CISTELA. — FARRICIUS.

S. g. *Pseudocistela*. (CROTCH.)

Ceramboides, L. — Dans les clairières sur les fleurs (RRR). (Cernay.)

S. g. *Gonodera*. (MULS.)

Luperus, HERBST. — Sur les buissons en fleurs (C). (Germaine, Merfy, Berru.)

S. g. *Hymenalia*. (MULS.)

Digitized by Google

Fusca, Illig. — En fauchant sur les fleurs (r). (Muizon.)
S. g. *Isomira*. (Muls.)

Murina, L. — Dans les endroits marécageux sur les fleurs (cc) +.

PRIONYCHUS. — Solier.

Ater, F. — Sous les écorces des vieux saules (rr) (Muizon, Hermonville.)

MYCETHOCHARES. — Latreille.

Barbata, Latr. — Dans le terreau des vieux arbres (rr)! (Courcelles.)

Bipustulata, Illig. — Un seul exemplaire trouvé à Reims, dans un chantier de bois. (Bellevoye.)

CTENIOPUS. — Solier.

Sulfureus, L. — Sur les fleurs (cc) +.

SERROPALPIDAE

ORCHESIA. — Latreille.

Micans, Panz. — Dans les bolets (rr). (Trigny.)

ANISOXYA. — Mulsant.

Fuscula, Illig. — Quelques exemplaires, trouvés à Guignicourt en battant une haie. (Bellevoye).

SERROPALPUS. — Hellenius.

Striatus, Hellen. - Dans les vieux troncs de sapin (rr). (Berru).

Digitized by Google

MELANDRIA. — Fabricius.

Caraboides, L. — Dans les vieux bois (RRR). (Rethel.) (Bellevoye.)

PYTHIDAE

SALPINGUS. — Gyllenhal.

Castaneus, Panz. — Sous les écorces (R). (Brimont, Bazancourt, Merfy.)

RHINOSIMUS. — Latreille.

Planirostris, F. — Sous les écorces; quelquefois dans les mousses des arbres (R)! Châlons-sur-Vesle.

LAGRIDAE

LAGRIA. — Fabricius.

Hirta, L. — En battant les arbres et les buissons (CC) +.

Atripes, Muls. — Comme le précédent (R)! (Germaine, Laifour.)

PYROCHROIDAE

PYROCHROA. — Geoffroy.

Coccinea, L. — Dans les bois, sur les plantes, les troncs d'arbres abattus, etc. (R) +.

Satrapa, Schr. — Comme le précédent (RR). (Germaine.)

Digitized by Google

PEDILIDAE

XYLOPHILUS. — Latreille.

Pygmaeus, Deg. — En battant les buissons (rr) !

SCRAPTIA. — Latreille.

Fusca, Latr. — Dans le terreau des vieux arbres; quelquefois en fauchant sur les herbes (rr) !

Minuta, Muls. — Comme le précédent (rrr)! (Bellevoye.)

MORDELLIDAE

Les mordellides se trouvent sur les fleurs, surtout sur les ombellifères et les composées, sur le troëne, le sureau, l'aubépine.

ANASPIS. — Geoffroy.

Geoffroyi, Mull. — (cc) +.

Maculata, Fourc. — (cc) +.

Frontalis, L. — (r), (Germaine, Rilly.)

Ruficollis, F. — (r) ! (Germaine.)

Subtestacea, Stepp. — (r) ! (Muizon.)

Rufilabris, Gyll. — (c) +.

MORDELLA. — Linné.

Bisignata, Redt. — (rr) ! (Ch. Demaison.)

Fasciata, F. (cc) +.

Aculeata, L. — (c) +.

Digitized by Google

SILARIA. — Mulsant.

Quadrimaculata, Gyll. — (rr). (Ay.)

MORDELLISTENA. — Costa.

Abdominalis, F. — (rr). (Aussonce, Germaine.)

Brunnea, F. (rr). (Germaine.)

Humeralis, L. (r). (Ay.)

Parvula, Gyll. — (c) (Rilly, Muizon.)

Brevicanda, Bohn. — (r). (Germaine.)

Micans, Germ. — (r). (Courcy.)

Pumila, Gyll. — (c) +.

Stenidea, Muls. — (rr). (Laifour.)

ANTHICIDAE

NOTOXUS. — Geoffroy.

Monoceros, L. — Sur les fleurs, les buissons, etc. (cc) +.

ANTHICUS. — Paykull.

Floralis. — En fauchant sur les fleurs (cc) +.

Quisquilius, Thoms. — Comme le précédent (cc) +.

Instabilis, Scht. — Sous les feuilles sèches, les détritus végétaux, etc. (c) +.

Antherinus, L. — Dans les détritus végétaux (cc) +.

Bifasciatus, Rossi. — Dans les endroits humides sur les fleurs (r)! (Muizon.)

Digitized by Google

VESICANTS

MELOIDAE

Les insectes de cette tribu se trouvent à terre sur les gazons.

MELOE. – Linné.

Proscarabaeus, L. — Au printemps (cc) +. La variété *cyaneus* (Muls.) se trouve aussi mais plus rarement.

Violaceus, Marsh. — (c) +.

Autumnalis, Ol. – (c) +.

Cicatricosus, Leach. — (rr) ?!

Coriarius, Brandt. — (rr) ! (Camp de Châlons.)

Variegatus, Donov. — (c) ! (Bezannes, Epernay, Merfy, Courcelles.)

Brevicollis (rr) ! (Trigny, Germaine.)

MYLABRIDAE

CEROCOMA — Geoffroy.

Schaefferi, L. — Sur les fleurs, de préférence sur *anthemis arvensis* (rr). (Verzy, Thuisy.)

Digitized by Google

CANTHARIDAE

CANTARIS. — Geoffroy.

Vesicatoria, L. — Sur le frêne et le troëne (cc) +.

SITARIS. — Latreille.

Muralis, Foerst. — Sur le paroi des grévières contenant des nids d'hyménoptères (rr) ! (Gueux.)

OEDEMERIDAE

ANONCODES. — Schmidt.

Ustulata, F. — Dans les marais sur les fleurs (r). (Courcelles-Muizon.)

ASCLERA — Schmidt.

Coerulea, L. — En fauchant sur les fleurs; quelquefois au printemps dans les souches vermoulues de peuplier (rr). (Châlons-sur-Vesle.)

OEDEMERA. — Olivier.

Podagrariae, L. — En fauchant sur les fleurs (c). Rilly, Muizon.)

Flavipes, F. — Comme le précédent (r), +.

Coerulea, L. — Comme les précédents (cc), +.

Digitized by Google

Virescens, L. — En fauchant dans les clairières (R). (Germaine.)

Lurida, MARSH. — Sur les fleurs des prairies humides (R)! (Trigny, Muizon, Thuisy.)

CHRYSANTHIA. — SCHMIDT.

Viridis, SCHT. — Sur les euphorbes (RRR). (Châlons-sur-Vesle.)

MYCTERUS. — CLAIRVILLE.

Curculionoides, F. — Dans les prairies sur les fleurs (RR). (Mesnil-sur-Oger, Trigny.)

Digitized by Google

CURCULIONIDES

OTIORHYNCHIDAE

OTIORHYNCHUS. — Schoenherr.

Raucus, F. — Dans les endroits sablonneux, sous les pierres, les plantes, etc. (c), +.

Scabrosus, Marsh. — Sous les pierres; quelquefois en battant les lierres (r)! (Pévy.)

Ligneus, Ol. — Sous les détritus végétaux; au pied des plantes, de préférence au pied de *Centaurea vulgaris* (r). (Muizon, Thuisy.)

Picipes, F. — En battant les haies, les buissons; cause quelquefois de grands dégâts dans les vignes en coupant les bourgeons (cc), +.

Sulcatus, F. — Dans les champs et les vignes où il cause souvent des dégâts (c), +.

Ligustici, L. — Dans les luzernes, les vignes, etc.; souvent en grand nombre à terre, sur les routes et les chemins (ccc), +.

Ovatus, L. — Au pied des plantes; quelquefois en secouant des herbes coupées (c), +.

Digitized by Google

PERITELUS. — Germar.

Griseus, Ol. — En battant les buissons au printemps, surtout l'aubépine en fleur (cc), +.

MYLACUS. — Schoenherr.

Rotundatus, F. — En tamisant des mousses en hiver (rr). (Pévy.) (Bellevoye.)

PHYLLOBIUS. — Germar.

Calcaratus, F. — Sur les aulnes au printemps (r)! (Germaine, Merfy.)

Pyri, L. — En battant les buissons au printemps (c), +.

Argentatus, L. — Sur l'aubépine en fleur (c), +.

Betulae, L. — Sur les aubépines et les arbres fruitiers en fleur (c), +.

Oblongus, L. — Sur les arbres fruitiers en fleur, de préférence les pommiers (r). (Taissy, Germaine.)

Pomonae, Ol. — Sur le peuplier, quelquefois sur les poiriers (c), +.

Viridiaereis, Laich. — En battant les buissons, les haies, etc. (c), +.

Sinuatus, F. — Sur les saules (rr). (Guignicourt, Muizon.)

BRACHYDERIDAE

POLYDROSUS. — Germar.

Marginatus, Steph. — Sur le chêne, l'aulne, le coudrier (cc), +.

Micans, F. — Sur les buissons au printemps (c), +.

Digitized by Google

Impressifrons, Gyl. - En battant au printemps les chênes et les aubépines (cc), +.

Cervinus, L. — Sur le chêne (cc), +.

Tereticollis, de Geer. — Au printemps, sur le hêtre et le chêne (c), +.

Planifrons, Gyll. — Sur le chêne (c), +.

Sericeus, Schal. — Sur le chêne, le saule, le noisetier (c), +.

Pterygomalis, Bohm. — Sur les buissons au printemps c), +.

SCIAPHILUS. — Schoenherr.

Muricatus, F. — Sous les mousses, les herbes au pied des arbres dans les endroits humides (c). (Cormontreuil, Germaine, Trigny.)

PLATYTARSUS. — Schoenherr.

Echinatus, Bonsdorff. — Sous les feuilles sèches dans les endroits humides (r). (Germaine.)

Setulosus, Bohm. — Sous les mousses, les feuilles mortes (rr)! (Germaine.)

FOUCARTIA. — J. Duval.

Squamulata, F. - Sous les mousses, les herbes sèches (rr). (Trigny.)

BARYPEITHES. — J. Duval.

Pellucidus, Bohm. — Dans les endroits sablonneux sous les pierres, les plantes, etc. (c), +.

Brunnipes, Ol. — Dans les bois sous les mousses (r). (Merfy, Germaine.)

Digitized by Google

STROPHOSOMUS. — Bilberg.

Coryli, F. — Sur le chêne, le coudrier, le sapin (cc), +.

Obesus, Marsh. — Comme le précédent (c), +.

Faber, Herbst. — Dans les endroits sablonneux sous les plantes; quelquefois sur les bruyères et la centaurée (r)! (Merfy.)

Retusus, Marsh. — Sur les bruyères (rr). (Rilly, Ludes.) (Bellevoye.)

Hispidus, Bohm. — Dans les endroits sablonneux sous les pierres (rr). (Merfy.)

SITONES. — Schoenherr.

Griseus, F. — En fauchant dans les prairies ou en secouant des herbes coupées (r). (Muizon, Thuisy.)

Regensteinensis, Herbst. — Sur les genets en fleur (cc), +.

Crinitus, Ol. — Sur les genets (cc), +.

Tibialis, Herbst. — Sur l'ajonc et le genet en fleur (c). (Rilly, Merfy, Germaine.)

Hispidulus. Germ. — Dans les champs de trèfle (c). (Berru, Germaine.)

Punctícollis, Steph. — Sur les trèfles et les luzernes (r)! (Trigny.)

Flavescens, Marsh. — En fauchant dans les marais, de préférence sur *Lotus uliginosus* (r). (Courcelles, Muizon.)

Humeralis, Steph. — En fauchant dans les prairies, sur les luzernes, etc. (c), +.

Lineatus, L. — Comme le précédent (cc), +.

Digitized by Google

TRACHYPHLOEUS. — Germar

Laticollis, Bohm. — Sous les feuilles sèches (rr). (Merfy.).

Alternans, Gyll. — Dans les grévières, les sablières, sous les pierres (r)! (Châlons-sur-Vesle.)

Scabriculus, L. — Comme le précédent (c). (Germaine, Châlons-sur-Vesle.)

Scaber, Seidl. — Dans les terrains arides sous les pierres (r)! (Merfy.)

Aristatus, Gyll. — Dans les endroits sablonneux (rr). (Germaine, Ludes.) (Bellevoye.)

CNEORHINUS. — Schoenherr.

Geminatus, F. — Dans les terrains sablonneux sous les gazons, les pierres (c), +.

LIOPHLOEUS. — Germar.

Nubilus, F. — En battant les lierres (r)! (Rilly, Germaine.)

BARYNOTUS. — Germar.

Obscurus, F. — Dans les détritus d'inondations (r)! (Thuisy, Ay.)

TANYMECUS. — Germar.

Palliatus, F. — Sur les chardons (r)! (Rilly, Trigny.)

CHLOROPHANUS. — Germar.

Viridis, L. — Sur le saule (r). (Laifour, Rethel.)

Digitized by Google

TROPIPHORIDAE

TROPIPHORUS. — Schoenherr.

Mercurialis, Sch. — En fauchant sur les plantes basses dans les bois humides (R). (Germaine.)

MINYOPIDAE

MINYOPS. — Schoenherr.

Variolosus, F. — Dans les endroits arides sous divers abris; quelquefois au pied des murs (R). (Thuisy, Ay.)

MOLYTIDAE

MOLYTES. — Schoenherr.

Coronatus, Goer. — A terre, dans les champs, sur les chemins; parfois au collet de la carotte sauvage (C), +.

PLINTHUS. — Germar.

Caliginosus, F. — Dans les lieux arides, sous les pierres (R)! (Ay.)

LIOSOMUS. — Schoenherr.

Deflexus, Panz. — Au pied des ranunculacées, surtout de *Ranunculus flammula*, *R. acris* et *R. repens* (R). (Thuisy, Germaine.)

Digitized by Google

HYPERIDAE

ALOPHUS. — Schoenherr.

Triguttatus, F. — Dans les champs, sur les gazons (c)! (Ay, Thuisy, Germaine.)

HYPERA. — Germar.

Punctata, F. — Dans les champs, sur les gazons, sous les pierres (cc), +.

Fasciculata, Herbst. — Sur *Erodium cicutarium* (r)! (Cernay.)

Alternans, Steph. — Dans les endroits marécageux (rr). (Taissy, Germaine.) (Bellevoye.)

Pollux, F. — Sur les ombellifères (r). (Trigny, Muizon, Thuisy.)

Rumicis, L. — En fauchant sur les *Rumex* (r)! (Germaine).

Meles, F. — Sur *Trifolium pratense* (c), +.

Tigrina, Bohm. — Dans les fleurs de la carotte sauvage (c), +.

Polygoni, F. — Sur les Silenées (c), +.

Suspiciosa, Herbst. — En fauchant dans les prairies humides (rr). (Germaine.)

Murina, F. — Sur la luzerne (r)! (Trigny.)

Variabilis, Herbst. — Sur le trèfle, la luzerne, etc. (c), +.

Plantaginis, de Geer. — Sur le plantain (c). (Berru, Châlons-sur-Vesle, Germaine.)

Trilineata, Marsh. — En fauchant dans les prairies (c). (Rilly, Trigny.)

Digitized by Google

Nigrirostris, F. — Dans les champs, principalement dans les champs de trèfle (CC), +.

LIMOBIUS. — SCHOENHERR.

Mixtus, BOHM. — En fauchant sur les *Erodium* (R). (Muizon, Thuisy.)

CLEONIDAE

RHYTIDERES. — SCHOENHERR.

Plicatus, OL. — Au collet du réséda sauvage (CC)! Châlons-sur-Vesle, Taissy, Thuisy, Germaine.)

PLAGIOGRAPHUS. — CHEVROLAT.

Obliquus, F. — Dans les endroits secs et chauds, grévières, sablières, etc. (RR)! (Tinqueux.)

MECASPIS. — SCHOENHERR.

Palmatus, OL. — Dans les lieux arides sous divers abris; quelquefois dans les champs sur les gazons (RR)! (Ay.)

Alternans, OL. — Dans les terrains incultes; parfois au premier printemps au pied des murs (R)! (Cormontreuil.)

Cinereus, SCHR. — Comme le précédent (R)! (Thuisy.)

CLEONUS. — SCHOENHERR.

Sulcirostris, L. — Sur les chardons (CC), +.

Tigrinus, PANZ. — Sur *Achillea millefolium* (R), +.

Digitized by Google

Trisulcatus, HERBST. — Dans les clairières, sur *Chrysanthemum leucanthemum* (RR). (Verzy, Germaine.) (BELLEVOYE.)

BOTHYNODERES. — SCHOENHERR.

Albidus, F. — Sur les Chenopodées (R)! (Trigny.)

LEUCOSOMUS. — MOTSCHULSKI.

Ophthalmicus, ROSSI. — Dans les endroits arides exposés au midi (R). (Camp de Châlons, Cernay.)

LIXUS. — FABRICIUS.

Paraplecticus, L. — Dans les tiges de Phellandrium aquaticum (C). (Muizon, Thuisy.)

Rufulus, BOHM. — Dans les endroits sablonneux; la larve se développe dans *Leontodon autumnale* (RR). (Châlons-sur-Vesle.)

Ascanii, L. — La larve se développe dans la tige de *Beta vulgaris* (RR)! (Trigny).

Spartii, OL. — Sur les genets (RR). (Rilly.)

Algirus, L. — Sur les malvacées (RR). (Germaine, Rilly, Trigny.)

Punctiventris, BOHM. — Sur diverses plantes dans les endroits sablonneux (RR). (Châlons-sur-Vesle.) (WARNIER.)

Bardanae, F. — Sur les Rumex (RR)! (Germaine.)

Bicolor, OL. — Sous les touffes d'*Erodium cicutarium* (R)! Merfy.

Digitized by Google

Sanguineus, Rossi. — Un exemplaire cité de Rethel. (Bellevoye.)

Filiformis, F. — Sur les chardons (r)! (Rilly, Thuisy.)

LARINUS. — Germar.

Turbinatus, Gyll. — Sur *Cirsium arvense* (r)! (Merfy.)

Sturnus, Schal. — Sur la centaurée (c)! (Rilly, Germaine.)

Conspersus, Bohm. — Comme le précédent (r)! (Muizon.)

Carlinae, Ol. — Sur les chardons (c), +.

Jaceae, F. — Comme le précédent (c), +.

RHINOCYLLUS. — Germar.

Latirostris, Latr. — Sur les chardons (c), +.

HYLOBIDAE

LEPYRUS. — Germar.

Colon, L. — Sur les saules (c), +.

Binotatus, F. — Sur le saule et les jeunes pins; aussi dans les détritus d'inondations (r). (Verzy, Thuisy, Muizon.)

HYLOBIUS. — Germar.

Abietis, L. — Dans les bois de pins (cc), +.

Fatuus, Ros. — En juin, sur *Lythrum salicaria* (rr). (Prouilly.) (Bellevoye.)

Digitized by Google

PISSODES. — Germar.

Notatus, F. — Sur les pins (c), +.

ERIRRHINIDAE

PSEUDOSTYPHLUS. — Tournier.

Pilumnus, Gyll. — Sur *Matricaria chamomilla* (rr)! (Muizon, Taissy.) (Bellevoye.)

ELLESCHUS. — Stephens.

Scanicus, Payk. — Sur le peuplier (rr). (Châlons-sur-Vesle.)

Bipunctatus, L. — Sur les Salicinées (r). (Thuisy, Germaine.)

SMICRONYX. — Schoenherr.

Cicus, Gyll. — Sur la cuscute, parfois en battant les saules (c)! (Thuisy-Merfy.)

PACHYTYCHIUS. — Jekel.

Haematocephalus, Gyll. - La larve vit dans les gousses de *Lotus corniculatus*, trouvé dans une grévière près de Reims. (Bellevoye.)

GRYPIDIUS — Schoenherr.

Equiseti, Gyll. — Endroits humides sur les prèles (r)! (Rilly, Thuisy.)

Digitized by Google

Brunniventris, F. — Comme le précédent (RR). (Thuisy.) (BELLEVOYE.)

ERIRRHINUS. — SCHOENHERR.

Festucae, HERBST. — Sur *Scirpus lacustris* (R). (Thuisy.)

Nereis, PAYK. — Sur *Calamagrostis lanceolata* et sur certaines cyperacées (R). (Thuisy.)

Scirpi, F. — Sur les cyperacées et dans les détritus d'inondations (R). (Ay, Thuisy.)

Acridulus, L. — Comme le précédent (C). (Thuisy, Muizon.)

DORYTOMUS. — STEPHENS.

Vorax, F. — En hiver, sous les écorces de peuplier et de platane; au printemps, en fauchant dans les prairies (CC), +.

Tremulae, PAYK. — Sur le tremble (R)! (Taissy.)

Tortrix, L. — Comme le précédent (C), +.

Nebulosus, GYLL. — Comme les précédents (RR). (Guignicourt, Muizon.)

Validirostris, GYLL. — Sur le peuplier et le saule (CC), +.

Filirostris, GYLL. — Sur le peuplier (C), +.

Dejeani, FAUST. — Comme le précédent (C), +.

Taeniatus, F. — Sur les saules (C), +.

Affinis, PAYK. — Dans les bois sur les buissons (R)! (Germaine.)

Agnathus, BOHM. — Sur les saules (R)! (Muizon.)

Digitized by Google

Majalis, PAYK. — Sur les saules (RR)!

Pectoralis, BOHM. — Comme les précédents (C)! (Muizon.)

Dorsalis, PAYK. — Dans les bois sur les saules (R). (Rilly, Germaine, Merfy.)

HYDRONOMUS. — SCHOENHERR.

Alismatis, MARSH. — Sur *Alisma plantago* (R). (Guignicourt, Saint-Imoges, Muizon.)

BAGOUS. — SCHOENHERR.

Petro, HERBST. — A la racine des plantes aquatiques (RR). (Cormontreuil, Courcelles.)

Frit, HERBST. — Au bord des eaux (RR). (Trépail.) (BELLEVOYE.)

TANYSPHYRUS. — SCHOENHERR.

Lemnae, F. — Sur les lemnacées (R). (Saint-Imoges.)

ANOPLUS — SCHOENHERR.

Plantaris, NAEZEN. — Sur le bouleau (C). (Rilly, Germaine.)

Roboris, SUFF. — Sur l'aulne (RR)! (Germaine.)

BRACHONYX. — SCHOENHERR.

Indigena, HERBST. — Sur *Pinus sylvestris* (C), +.

Digitized by Google

CRYPTORHYNCHIDAE

OROBITIS. — Germar.

Cyaneus, L. — Dans les bois en fauchant sur les violettes (R). (Germaine.)

CRYPTORHYNCHUS. — Illiger.

Lapathi, L. — Sur les saules (C). +.

ACALLES. — Schoenherr.

Camelus, F. — En secouant les vieux fagots (RR). (Chigny, Germaine.)

Roboris, Curt. — Dans le bois mort, surtout de chêne (R). (Chigny, Germaine, Rilly.)

Lemur, Germ. — Comme le précédent (RR). (Germaine.)

Ptinoides, Marsh. — Dans les écorces de chêne (RR). (Germaine.) (Bellevoye.)

MAGDALINIDAE

MAGDALINUS. — Germar.

Memnonius, Gyl. — Sur les pins malades (RR), (Aussonce, Merfy.)

Phlegmaticus, Herbst. — Sur les pins (RR). (Cernay.) (Bellevoye.)

Digitized by Google

Rufus, GERM. — Comme les précédents (R . (Cernay, Châlons-sur-Vesle.)

Duplicatus, GERM. — Comme les précédents (C). (Berru, Châlons-sur-Vesle.)

Exarutus, BRIS. — Sur le chêne (RR). (Rilly.)

Cerasi, L. — Sur l'aubépine et les arbres fruitiers (C), +.

Aterrimus, F. — Sur l'aubépine (C). (Ay, Germaine.)

Barbicornis, LATR. — Sur l'aubépine, le pommier (RR). (Germaine.)

Flavicornis, GYLL. — Sur le chêne; quelquefois sur l'aubépine (C). (Germaine, Rilly.)

Pruni, L. — Sur les arbres fruitiers (C). (Rilly, Germaine, Châlons-sur-Vesle.)

BALANINIDAE

BALANINUS. — GERMAR.

Pellitus, BOHM. — Sur le chêne (RR). (Gueux.) (BELLEVOYE.)

Venosus, GRAV. — Comme le précédent (C), +.

Nucum, L. — Sur les noisetiers (C), +.

Turbatus, GYLL. — Sur le chêne; aussi sur le saule (R), +.

Villosus, F. — Sur le chêne (R). (Ludes, Germaine.)

Crux, F. — Sur les saules (C), +.

Brassicae, F. — Comme le précédent (C), +.

Pyrrhoceras, MARSH. — Sur le chêne (CC), +.

ANTHONOMIDAE

ANTHONOMUS. — GERMAR.

Rectirostris, L. — Sur les cerisiers, en juin (RR). (Germaine.)

Digitized by Google

Rubi, HERBST. — Sur l'aubépine, les ronces, etc. (C). (Guignicourt, Rilly, Germaine, Merfy.)

Pyri, BOHM. — Dans les jardins fruitiers ; la larve vit et se développe dans les bourgeons des poiriers (C). (Trigny, Rilly, Ludes.)

Pedicularius, L. — Sur l'aubépine en fleur (C). (Germaine, Brimont, Ludes, Trigny.)

Rufus, GYLL. — Sur les arbres fruitiers (RRR). (Ludes, Trigny.) — La variété *Pruni* (DESBR.) a été trouvée à Guignicourt, sur des aubépines.

Pomorum, L. — En battant au printemps les pommiers et les poiriers (R). (Rilly, Merfy.)

ORCHESTES. — ILLIGER.

Quercus, L. — Sur le chêne (C), +.

Rufus, OL. — En battant les ormeaux (RR). (Cernay.)

Alni, L. — Sur les ormes (CC), +.

Ilicis, F. — Sur le chêne (RR). (Trigny, Germaine.)

Erythropus, GERM. — Sur le chêne (RR). (Rilly). (BELLEVOYE.)

Iota, F. — Sur les bouleaux (RR). (Merfy, Chenay.)

Fagi, L. — Sur les hêtres (RR). (Germaine.)

Pratensis, GERM. — Sur les chênes (RR). (Jonchery.) BELLEVOYE.)

Lonicerae, HERBST. — Sur le chèvrefeuille (RR) !

Rusci, HERBST. — Sur le bouleau ; quelquefois sur le saule (RR). (Rilly.) (BELLEVOYE.)

Avellanae, DONOV. — Sur le chêne (RR). (Germaine.)

Populi, F. — Sur les saules (CC), +.

Decoratus, GERM.— Comme le précédent (RR). (Tinqueux.)

Salicis, L. — Comme les précédents (CC), +.

Stigma, GERM. — Sur les saules (R), +.

Digitized by Google

RHAMPHUS. – Clairville.

Flavicornis, Clairv. — Sur les feuilles des aulnes, au printemps (cc). (Rilly, Merfy, Trigny.)

Aeneus, Bohm. — Sur les arbres fruitiers et sur l'aubépine en fleur (rr). (Châlons-sur-Vesle.) (Bellevoye.)

CORYSSOMERIDAE

CORYSSOMERUS. — Schoenherr.

Capucinus, Beck. — Sur *Achillea millefolium* (r) ! (Tinqueux, Germaine.)

SIBYNIDAE

LIGNYODES. — Schoenherr.

Enucleator, Panz. — En battant les buissons, au printemps (rr). (Rilly, Trigny.)

SIBYNIA. — Germar.

Quinque punctata, L. — En fauchant dans les prairies. La larve vit dans les gousses de *Vicia angustifolia* (cc), +.

Venusta, F. — Sur les genêts (c), +.

Juncea, Reiche. — Sur *Melilotus macrorhiza* (c), +.

Meliloti, Steph. — Sur *Melilotus macrorhiza* et *Melilotus officinalis* (b), +.

Pusilla, Germ. — En fauchant dans les prairies (c), +.

Tomentosa, Herbst. — Comme le précédent (cc), +.

Digitized by Google

Cuprifera, Panz. — En fauchant dans les endroits arides et chauds (rr). (Châlons-sur-Vesle, Trigny.)

Picirostris, F. — En fauchant sur les trèfles (c), +.

Primita, Herbst. — En fauchant dans les terrains secs, surtout sur les *Helianthemum* (c), +.

Phalerata, Stev. — Dans les terrains arides (rrr). (Châlons-sur-Vesle.)

Pellucens, Scop. — Sur *Lychnis vespertina* (r)! (Germaine, Trigny.)

Viscariae, L. — Sur *Silene inflata* (r)! (Merfy, Germaine.)

Potentillae, Germ. — Sur *Potentilla reptans* (r). (Rilly, Thuisy.)

MECINUS. — Germar.

Pyraster, Herbst. — Sur le plantain (c), +.

GYMNETRON. — Schoenherr.

Pascuorum, Gyll. — Sur le plantain (r)! (Châlons-sur-Vesle, Germaine.)

Erinaceus, Bedel. — Un seul exemplaire, trouvé dans les rues de Reims.

Labilis, Herbst. — Sur les plantains ; quelquefois sur les saules (c). (Muizon, Courcelles.)

Rostellum, Herbst. — Sur *Achillea millefolium;* parfois au pied des aubépines, pendant l'hiver (rr)! (Germaine.)

Netus, Germ. — Sur *Linaria vulgaris* (rr)! (Thuisy.)

Herbarum, Bris. — Sur *Linaria vulgaris;* a été aussi trouvé sur des pommiers en fleur (rr)! (Trigny.)

Campanulae, L. — Les Campanules (rr). (Germaine.)

Plantarum, Germ. — Sur *Linaria vulgaris* (c). +.

Digitized by Google

CIONUS. — Clairville.

Scrophulariae, L. — Sur *Scrophularia aquatica* et *Scrophularia nodosa* (c).+.

Verbasci, F. — Comme le précédent (r). +.

Olivieri, Rosensch. — Sur *Verbascum thapsus* (c) +.

Thapsus, F. — Sur les *Verbascum* (r). (Châlons-sur-Vesle.)

Hortulanus, Marsh. — Sur *Scrophularia nodosa* (r). (Germaine.)

Blattariae, F. — Sur *Scrophularia aquatica* (r)! (Germaine.)

Fraxini, de Gerr. — Sur le Frêne; quelquefois en battant les haies (rr). (Rilly, Trigny.)

NANOPHYES. — Schoënherr.

Flavidus, Aubé. — Dans les bruyères; trouvé une fois en battant des genêts (rrr). (Rilly.)

Lythri, F. — Sur *Lythrum salicaria* (cc). +.

CENTORHYNCHIDAE

MONONYCHUS. — Germar.

Pseudacori, F. — Sur *Iris pseudacorus* (cc). +.

Salviae, Germ. — Comme le précédent (r). +.

STENOCHARUS. — Thomson.

Guttula, F. — Dans les endroits chauds et arides (r)! (Thuisy, Merfy, Germaine.)

Fulginosus, Marsh. — Dans les clairières des bois sablonneux (c). +.

Digitized by Google

COELIODES. — Schoenherr.

Quercus. F. — Sur le chêne (c). +.

Ruber, Marsh. — Comme le précédent (r). (Rilly, Germaine.)

Subrufus, Herbst. — En battant les haies, les buissons, etc. (c), +.

Rubicundus, Payk. - En fauchant dans les clairières (rr). Trouvé une fois à Chamery sur un genévrier (Bellevoye).

CIDNORHINUS. — Thomson.

Quadrimaculatus, L. — Sur les orties (cc). +.

NEDYUS. — Stephens.

Litura, F. — Sur les chardons (rr). (Germaine, Châlons-sur-Vesle.)

Trimaculatus, F. — Comme le précédent (rr). (Rilly.)

Echii, F. — Sur *Echium vulgare* (c). +.

Melanostictus, Marsh. — Sur *Mentha aquatica* et *Lycopus europaeus* (r) ! (Thuisy.)

Asperifoliarum, Gyll. — Sur les borraginées, parfois sur les orties (c). +.

Rugulosus. Herrst. — En fauchant dans les prairies (r). (Trigny.)

Campestris, Gyll. — Comme le précédent (c) ! (Germaine, Rethel.)

COCHIASTES. — Weise.

Lamii. F. Sur les *Lamium* (rr). (Tinqueux, Rilly.)

Digitized by Google

THAMIOCOLUS. — Thomson.

Pubicollis, Gyll. — En fauchant dans les clairières (rr). (Rilly.)

CEUTORHYNCHUS. — Germar.

Raphani, Gyll. — Sur *Symphitum officinale* (rr). (Germaine.)

Punctiger, Gyll. — Sur *Taraxacum officinale* (c). +.

Marginatus, Payk. — Sur les *Hypochaeris* (r). (Taissy, Trigny, Muizon.)

Suturalis, F. — Sur les fleurs des *Allium* (rr). (Ay.)

Consputus, Germ. — Dans les endroits sablonneux à la racine des plantes (rr). (Châlons-sur-Vesle, Berru.)

Quercicola, Payk. — En fauchant dans les prairies (rr). (Courcelles.)

Nigrinus, Marsh. — Sur les Crucifères (rr). (Taissy, Rilly.)

Denticulatus, Ol. — Dans les champs, sur le bord des fossés, le long des murs, etc. (c). (Thuisy, Muizon, Germaine.)

Macula alba, Herbst. — Sur le coquelicot et autres plantes de la famille des Papaveracées (r). +

Alliariae, Bris. — Sur les *Sisymbrium* (rr). (Taissy, Muizon.)

Pleurostigma, Marsh. — Sur les Crucifères (c). +.

Faeculentus, Gyll. — Un seul exemplaire trouvé dans la ville le long d'un mur.

Picitarsis, Gyll. — Sur les Crucifères, de préférence sur *Brassica napus* (r) ! (Trigny.)

Quadridens, Panz. — Sur les Crucifères (r). +.

Digitized by Google

Hirtulus, GERM. — Comme le précédent (R) ! (Taissy.)

Chalybaeus, GERM. — Sur les Crucifères, surtout sur *Thlaspi arvense* (R) ! (Ay.)

Sulcicollis, PAYK. — Dans les clairières sur les Crucifères (RR). (Merfy, Germaine.)

Erysimi, F. — Sur les Crucifères (C).+.

Contractus, MARSH. — Comme le précédent (CC). +.

Cochleariae, GYLL. — Comme les précédents (R) ! (Courcelles, Muizon.)

Assimilis, PAYK. — Sur *Sinapis arvensis* et *Brassica nigra* (C). +.

Arator, GYLL. — Sur *Hesperis matronalis* (RRR). (Taissy.)

Syrites, GERM. — En fauchant dans les marais (RRR). (Muizon, Thuisy.)

CEUTORHYNCHIDIUS.

Melanarius, STEPH. — Sur le cresson (RR). (Thuisy.)

Floralis, PAYK. — Sur les Crucifères (CC). +.

Pulvinatus, GYLL. — Sur la camomille (RR) (Berru.)

Apicalis, GYLL. — En fauchant dans les clairières (RRR). (Rilly.)

Terminatus, HERBST. — En faucbant dans les prairies humides (RR). (Sillery, Thuisy.)

Pumilio, GYLL. — Sur les Crucifères (RR). (Germaine.)

Troglodytes, F. — Sur le plantain (CC). +.

Frontalis, BRIS. — Comme le précédent (RR). (Courcelles.)

MICRELUS. — THOMSON.

Ericae, GYLL. — Sur les bruyères (R). (Rilly, Merfy.)

Digitized by Google

RHYTIDOSOMA. — Stephens.

Globulus, Herbst. — Sur le peuplier (rr). (Rilly.)

TAPINOTUS. — Schoenherr.

Sellatus, F. — Sur *Lysimachia vulgaris* (rr). (Thuisy, Muizon.)

POOPHAGUS. — Schoenherr.

Sisymbrii, F. — Sur le cresson (r). (Ay, Thuisy, Courcelles.)

RHINONCUS. — Stephens.

Castor, F. — Sur *Polygonum hydropiper* (r). (Muizon, Sillery.

Inconspectus, Gyll. — Sur les *Polygonum* (c) +.

Pericarpius, L. — Comme les précédents (cc). +.

Guttalis, Grav. — Dans les endroits humides sur les *Polygonum* (r). (Taissy.)

Albicinctus, Gyll. — Comme le précédent (rrr). (Guignicourt.)

PELONOMUS. — Thomson.

Waltoni, Bohn. — Dans les bois humides sur *Polygonum hydropiper* (rr). (Germaine.)

Comari, Herbst. — En fauchant dans les lieux humides (rr). (Thuisy.)

Quadrituberculatus, F. — Dans les endroits humides sur *Polygonum* (c). +.

Digitized by Google

PACHYRHINUS. — KIRBY.

Quadricornis, GYLL. — En fauchant dans les endroits marécageux (RR). (Thuisy.)

AMALUS. — SCHOENHERR.

Scortillum, HERBST. — En fauchant dans les bois (R). +.

BARIDIDAE

BARIDIUS. — SCHOENHERR.

Morio, BOHN. — Sur *Reseda luteola* (RRR). (Ay.)

Picinus, GERM. — Sur les Crucifères (R). +.

Lepidii, GERM. — Dans les bois humides (RR). (Germaine.)

Picicornis, MARSH. — Sur *Reseda lutea* (C). +.

Coerulescens, SCOP. — Sur les Crucifères (C). +.

Chlorizans, GERM. — Comme le précédent (R). (Courcelles, Cernay.)

T. album, L. — Dans les marais sur les joncs (CC). +.

CALANDRIDAE

SPHENOPHORUS. — SCHOENHERR.

Piceus, PALLAS. — Un exemplaire trouvé à Pierry (DELSUC).

Mutilatus, LAICH. — Dans les détritus d'inondation, quelquefois dans les endroits inondés pendant l'hiver (C). +.

Digitized by Google

SITOPHILUS. — Schoenherr.

Granarius, L. — Dans les greniers à blé (cc). +.

COSSONIDAE

COSSONUS. — Clairville.

Linearis, F. — Sous les écorces de saule et de peuplier (r) +.

Planatus, Bedel. — Comme le précédent (cc). +.

RHYNCOLUS. — Germar.

Punctatulus, Bohm. — Dans les troncs vermoulus de divers arbres, trouvé aussi dans les plaies des vieux ormes (rr) ! (Courcelles.)

Culinaris, Germ. — Sous les écorces de divers arbres : chêne, orme, tilleul, etc. (r) ! (Germaine.)

APIONIDAE

APION. — Wenker.

Pomonae, F. — En fauchant dans les prairies, sur *Latyrus pratensis ;* quelquefois sur les saules et les chênes (cc). +.

Craccae, L. — Sur *Latyrus sylvestris* et *Vicia Cracca* (r). (Muizon, Thuisy.)

Cerdo, Gerst. — Sur *Vicia cracca* (rr). (Rilly, Muizon.)

Subulatum. Kirby. — Sur *Lotus corniculatus* et *Latyrus pratensis* (rr). (Thuisy.)

Digitized by Google

Carduorum, KIRBY. — Sur les feuilles d'artichaut (CC). +.

Onopordi, KIRBY. — Sur *Centaurea nigra* (C). +.

Confluens, KIRBY. — Sur *Matricaria chamomilla* (R) ! (Germaine.)

Brisouti, BEDEL. — Un seul exemplaire trouvé à Fère-Champenoise (BELLEVOYE).

Vicinum, KIRBY. — Sur *Mentha aquatica* (R) ! (Taissy.)

Ulicis, FORST. — Sur *Ulex europeus* (RR). (Merfy, Rilly.) (BELLEVOYE.)

Difficile, HERBST. — Sur les genêts (RR). (Rilly, Trépail.) (BELLEVOYE.)

Genistae, KIRBY. — Sur *Genista anglica* (RR). (Rilly.) (BELLEVOYE.)

Fuscirostre, F. — Sur *Sarothamnus vulgaris* (C). +.

Flavofemoratum, HERBST. — Sur les genêts (C). +.

Vernale, F. — En fauchant sur les orties (R). +

Aeneum, F. — Sur *Malva sylvestris* (R). (Thuisy, Germaine.)

Radiolus, KIRBY. — Sur les mauves (C). +.

Elegantulum, GERM. — Sur *Trifolium pratense* (C). +.

Striatum, KIRBY. — Sur les genêts (RR). (Rilly.) (BELLEVOYE.)

Immune, KIRBY. — Sur *Sarothamnus vulgaris* (C). (Rilly, Germaine.)

Pubescens, KIRBY. — Sur les saules (R). (Muizon.)

Simile, KIRBY. — En fauchant dans les clairières (RR). (Rilly, Germaine.)

Seniculum, KIRBY. — Sur *Trifolium pratense;* sur l'aulne et le saule (C). +.

Viciae, PAYK. — Sur *Vicia cracca* et *Melilotus macrorhiza* (R). (Rilly, Muizon, Thuisy.)

Digitized by Google

Varipes, GERM. – Sur *Trifolium pratense* (R). (Rilly, Thuisy.)

Apricans, HERST. – Comme le précédent (CC). +

Assimile, KIRBY. — Comme les précédents (R). (Germaine, Rilly, Guignicourt.)

Trifolii, L. — Comme les précédents (CC). +.

Flavipes, F. — Sur *Trifolium repens* et *t. pratense*

Nigritarse, KIRBY. — Sur *Epipactis latifolia*, *Trifolium procumbens*, *t. repens* et *t. fragiferum* (C). +.

Ebeninum, KIRBY. — Sur *Lotus corniculatus* et l. *Uliginosus* (RR). (Germaine, Thuisy.)

Tenue, KIRBY. — Sur les légumineuses, des genres *Medicago* et *Melilotus* (C). +.

Punctigerum, PAYK. — Sur *Vicia Sepium* (R). (Germaine.)

Virens, HERBST. — Sur *Trifolium pratense* (R). (Thuisy, Merfy, Trigny.)

Ervi, KIRBY. — Sur *Latyrus pratensis* (R), (Rilly, Germaine.)

Ononidis, KIRBY. — Sur *Ononis spinosa* (C). +.

Filirostre, KIRBY. — En fauchant dans les prairies (RR). (Courcelles, Guignicourt.)

Minimum, HERBST. — Sur les saules (C). (Rilly, Thuisy, Muizon.)

Pisi, F. — Sur *Vicia sepium* (CC). +.

Gracilicolle, GYLL. — En fauchant dans les prairies (RR). (Ay.)

Sorbi, KIRBY. — Sur *Anthemis arvensis*; un exemplaire ♀ trouvé à Ludes (BELLEVOYE).

Angustatum, KIRBY. — Sur *Lotus corniculatus* (C). (Germaine, Rilly, Muizon, Thuisy.)

Digitized by Google

Spencei, KIRBY. — Sur *Vicia cracca* (RR). (Muizon.)

Vorax, HERBST. — Sur les pois, le noisetier, le sapin (C). +.

Lanigerum, GYLL. — Dans les endroits chauds et sablonneux (RR). (Châlons-sur-Vesle.)

Livescerum, GYLL. — Sur *Onobrychis sativa* (R). (Muizon, Germaine.)

Miniatum, GERM. — Sur les *Rumex* (C). (Germaine, Trigny, Thuisy.)

Frumentarium, GYLL. — Sur *Rumex acetosella* (C). (Germaine, Merfy.)

Rubens, STEPH. — Comme le précédent (R). (Germaine.) (BELLEVOYE.)

Malvae, F. — Sur les mauves (R). (Muizon, Thuisy.)

Sedi, GERM. — Sur les *Sedum* (RR). (Merfy.)

Violaceum, KIRBY. — Sur les *Rumex* (CC). +.

Marchicum, HERBST. — En fauchant dans les clairières des bois (R). (Germaine.)

Humile, GERM. — Sur *Rumex acetosa* (C). +.

Simum, GERM. — Sur *Hypericum perforatum* (RR). (Germaine.)

ATTELABIDAE

APODERUS. — OLIVIER.

Coryli, L. — Sur le noisetier (CC). +.

ATTELABUS. — LINNÉ.

Curculionoides, L. — Sur le Chêne (CC). +.

Digitized by Google

RHINOMACERIDAE

RYNCHITES. – Herbst.

Betuleti, F. – Sur le bouleau (cc). +.

Populi, L. — Sur le peuplier et le bouleau (cc). +.

Auratus, Scop. — Sur le prunellier (r). (Germaine, Berru.)

Bacchus, L. — Sur les arbres fruitiers (rr). (Trigny, Germaine.)

Aequatus, L. — Sur l'aubépine (cc). +.

Parellinus, Gyll. — Dans les endroits marécageux, sur *Thalictrum flavum* (rrr). (Thuisy.) (Bellevoye.)

Interpunctatus, Step. — Sur les chênes (rrr). (Germaine.) (Bellevoye.)

Germanicus, Herbst. — Comme le précédent (r). (Rilly, Germaine.)

Aeneovirens, Marsh. — Sur les chênes (r). (Germaine.)

Pauxillus, Germ. – Sur les arbres fruitiers et le prunellier (c). (Germaine, Chenay.)

Conicus, Illig. — En battant les poiriers (rr). (Chigny, Rilly.)

Cupreus, L. – Sur les arbres fruitiers, les pruniers surtout (rr). (Trigny, Germaine.)

Tomentosus, Gyll. — Sur les jeunes pousses d'aulne (c). (Rilly, Germaine.)

Nanus, Payk. — Sur le bouleau (r). (Boult-sur-Suippe, Thuisy, Germaine.)

Megacephalus, Germ. – Comme le précédent (rrr). (Germaine.)

Digitized by Google

Betulae, L. — Sur le bouleau, l'aulne et le noisetier (cc). +.

Pubescens, F. — Sur le chêne (c). (Germaine.)

Olivaceus, Gyll. — Sur le chêne (r). (Germaine.) (Bellevoye.)

Sericeus, Herbst. — Comme le précédent (r). (Rilly, Germaine.)

DIODYRHYNCHUS. — Germar.

Austriacus, Ol. — Sur les pins (rr). (Ludes, Germaine, Pontfaverger, Châlons-sur-Vesle.)

RHINOMACER — Geoffroy.

Attelaboides, F. — Comme le précédent (c). +.

Digitized by Google

ANTHRIBIDES

TROPIDERES. — Schoenherr.

Albirostris, Herbst. — Dans le bois mort de chêne et le peuplier (rr). (Germaine, Merfy.)

Niveirostris, F. — Dans le bois mort de chêne et de tilleul (rrr). Guignicourt.)

BRACHYTARSUS. — Schoenherr.

Scabrosus, F. — Sous les écorces d'Orme (r). (Sillery, Courcelles.)

Varius, F. — Sous les écorces de sapin (c). +.

Digitized by Google

BRUCHIDES

BRUCHUS. — Linné.

Pisi, L. — Dans les pois (ccc). +.

Pallidicornis, Bohm. — Dans les lentilles (r). +.

Lentis, Bohm. — Comme le précédent (rr) ! (Thuisy.)

Sertatus, Illig. — Comme les précédents (c). +.

Rufipes, Herbst. — Dans les gousses de *vicia angustifolia* et v. *Sativa* (cc). +.

Luteicornis, Illig. — Comme le précédent (cc). +.

Griseomaculatus, Gyll. — En fauchant dans les prairies (rr). (Germaine.)

Affinis, Froehl. — En fauchant sur les luzernes (r). (Rilly.)

Granarius, L. — Sur *Vicia cracca* et *Beta vulgaris* (c) ! (Germaine, Trigny).

Loti, Payk. — En fauchant dans les prairies au printemps (rr). (Taissy, Trigny.)

Laticollis, Bohm. — Comme le précédent (r). (Thuisy, Germaine.)

Seminarius, L. — Comme les précédents (c). +.

Digitized by Google

Olivaceus, Germ. — En battant les haies (r) ! (Germaine.)

Debilis, Gyll. — En fauchant dans les prairies (rr). (Merfy, Thuisy.)

Varius, Ol. — En fauchant sur les luzernes (cc). +.

Pygmaeus, Bohm. — Sur *Raphanistrum arvense*, *Trifolium incarnatum* et *Lotus corniculatus* (c). +.

Pubescens, Germ. — En battant les haies (rr), (Bazancourt, Rilly.)

Ater, Marsh. — Sur les fleurs et dans les graines d'accacia (r). (Germaine, Rilly.)

Lallemanti, Mars. — Dans les graines de cassier (espèce importée).

SPERMOPHAGUS. — Stevens.

Cardui, Stev. — En fauchant dans les prairies (cc). +.

URODON. — Schoenherr.

Suturalis, F. - Sur *Reseda lutea* (c). +.

Conformis, Suff. — Sur *Reseda luteola* (r) ! (Cernay, Muizon.)

Rufipes. Ol. — Sur *Reseda lutea* (cc). +.

Digitized by Google

XYLOPHAGES

HYLASTES. — Erichson.

Ater, Payk. — Sous les écorces des pins (cc). +.

Cunicularius, Er. — Sur les sapins (rr). (Sapicourt.) (Bellevoye.) (Espèce importée.)

Attenuatus, Er. — Dans les souches et sous les écorces du pin sylvestre (c). (Merfy, Thuisy.)

Angustatus, Herbst. — Comme le précédent (c). (Thuisy, Trigny.)

Opacus, Er. — Comme les précédents (r). (Merfy, Châlons-sur-Vesle.)

Palliatus, Gyll. — Sur les écorces des conifères (r). (Muizon.)

Trifolii, Müll. — Sur *Trifolium pratense*; se trouve aussi dans les brindilles mortes de genêt (c). +.

HYLURGUS. — Latreille.

Ligniperda, F. — Sous les écorces des pins (r). (Taissy, Trigny, Brimont.)

Digitized by Google

BLASTOPHAGUS. — Eichhoff.

Piniperda, L. — Sous les écorces des pins abattus (R). (Brimont, Merfy, Trigny, Thuisy.)

CISSOPHAGUS. — Chapuis.

Hederae, Schm. — Dans les branches mortes de lierre (RR) !

PHLOEOSINUS. — Chapuis.

Thuyae, Per. — Sous les écorces de thuya (RR) (Guignicourt. (Bellevoye).

HYLESINUS. — Fabricius.

Fraxini, F. — Sous les écorces de frêne (CC). +.

Kraatzi, Eich. — Sous les écorces d'orme (R) ! (Ay.)

Vittatus, F. — Comme le précédent (C). +.

PHLOEOPHTHORUS. — Wollaston.

Spartii, Nord. — Sous les écorces de *Sarothamnus scoparius* (C). (Rilly, Germaine.)

PHLOEOTRIBUS. — Latreille.

Oleae, F. — Trouvé une seule fois dans une sablière à Châlons-sur-Vesle (Bellevole.)

SCOLYTUS. — Geoffroy.

Destructor, Ol. — Sous les écorces d'orme (CC). +.

Digitized by Google

Intricatus, Ratz. — Sous les écorces de chêne (cc). (Cernay, Germaine.)

Multistriatus, Marsh. — Sous les écorces d'orme (cc). +.

CRYPTURGUS — Er.

Pusillus, Gyll. — Sous les écorces des pins (rr). (Verzy.) (Bellevoye.)

CRYPHALUS. — Erichson.

Abietis, Pratz. — Trouvé à Verzy et à Châlons-sur-Vesle. (Bellevoye.)

PITYOPHTHORUS. — Eichhoff.

Ramulorum, Perris. — Dans les rameaux de bois mort de divers conifères (r). (Thuisy, Berru.)

XYLOCLEPTES. — Ferrari

Bispinus, Duft. — Sous les écorces de la clématite (c) +.

TOMICUS. — Latreille.

Stenographus, Duft. — Sous les écorces des vieux pins (r). (Thuisy, Trigny.)

Rectangulus, Ferr. — Comme le précédent (rr). (Cernay.)

Laricis, F. — Sous l'écorce des sapins abattus (cc). +.

Bidentatus, Herbst. — Sous l'écorce des branches supérieures des pins (rr). (Chamery.) (Bellevoye.)

Digitized by Google

XYLEBORUS. — Eichhoff.

Dispar, F. — Dans le bois de marronnier (RR). (Germaine.) (Bellevoye.)

Saxeseni, Ratz. — Sous les écorces de l'aulne et du chêne ; trouvé aussi avec le précédent (R). (Germaine, Taissy.)

Dryographus, Ratz. — Dans le bois de chêne (R). (Laifour.)

Digitized by Google

LONGICORNES

SPONDYLIDAE

SPONDYLIS. — Fabricius.

Buprestoides, L. — Dans les bois de pins (RRR). (Damery, Trigny.)

PRIONIDAE

PRIONDUS. — Fabricius.

Coriarius, L. — Dans les vieilles souches des arbres abattus (RRR). (Château des Maretz.)

LEPTURIDAE

RHAGIUM. — Fabricius.

Sycophanta, Schr. — Dans les bois de chêne (C). +.

Mordax, de Geer. — Comme le précédent (R). (Germaine, Berru.)

Digitized by Google

RHAMNUSIUM — Latreille.

Bicolor, Schr. — Sur les troncs d'ormes et de tilleuls (r). (Courcelles, Rilly, Tinqueux.)

TOXOTUS. — Serville.

Meridianus, L. — Dans les prairies sur diverses fleurs (r). +.

ACMAEOPS. — Leconte.

Collaris, L. — Dans les bois sur les fleurs (r). (Berru, Germaine.)

CORTODERA. — Mulsant.

Humeralis, Schall. — On ne trouve pas dans notre région, le type, mais la var. *suturalis*, F. — Dans les bois de chêne (rr). (Germaine.)

LEPTURA. — Linné.

Vadonia (Mulsant).

Livida, F. — En fauchant dans les prairies (r). (Merfy, Thuisy, Germaine.)

Fulva, de Gerr. — Sur les fleurs (cc). +.

Judolia (Mulsant).

Cerambyciformis, Schr. — Sur les ombellifères, les rosacées, etc. (rr) +.

Digitized by Google

Stenura (KUSTER).

Aurulenta, F. — Sur les souches et dans les vieux bois de saule et d'aulne (RRR). (Rilly, Germaine.)

Maculata, POD. — En fauchant dans les prairies surtout sur les ombellifères (R) +.

Aethiops, PODA. — Dans les clairières sur les fleurs (R). (Rilly, Germaine.)

Revestita, L. — Dans les vieux ormes (RRR) ! (Germaine).

Melanaria, L. — Sur les fleurs de diverses plantes (CC) +.

Bifasciata, MÜLL. — Sur les fleurs des ombellifères, sur les ronces, etc. (CC) +.

Nigra, L. — En fauchant dans les bois sur les fleurs (CC). +.

ALOSTERNA. — MULSANT.

Tabacicolor, DE GEER. — Sur les buissons en fleur (C). +.

GRAMMOPTERA. — SERVILLE.

Ustulata, SCHAL. — Dans les bois de chêne (RR). (Germaine).

Ruficornis, F. — Sur les buissons en fleur (CC). +.

Variegata, GERM. — Dans les bois, sur les fleurs (RRR). (Germaine.)

CERAMBYCIDAE

NECYDALIS. — LINNÉ.

Major, L. — Dans les troncs des vieux arbres, saule, peuplier, etc., vole le soir (RRR). (Tinqueux, Fismes.)

Digitized by Google

STENOPTERUS. — Olivier.

Rufus, L. — Dans les prairies sur les fleurs (cc). +.

OBRIUM. — Latreille.

Cantharinum, L. — Dans le bois de saule et de peuplier (rr) !

LEPTIDEA. — Mulsant.

Brevipennis, Muls. — Dans les tiges d'osier (rr) !

GRACILIA. — Serville.

Pygmaea, F. — En secouant les vieux paniers d'osier, vermoulus et recouverts de leur écorce. (cc) +.

CERAMBYX. — Linné.

Scopolii, Fuess. — Sur le sureau en fleur (r). (Germaine, Trigny.)

HESPEROPHANES. — Mulsant

Cinereus, Villers. — Dans les vieilles charpentes de chêne (rrr) ! (Merfy.)

ASEMUM. — Eschsholtz.

Striatum, L. — Dans les vieilles souches de pins abattus (c). +.

Digitized by Google

PHYMATODES. — Mulsant.

Lividus, Ros. — Dans les caves et celliers, dans les vieux cerceaux de chataignier (RR) !

Variabilis, L. — Sous les écorces des bois malades ou morts, le chêne, le hêtre, etc. (CC). +.

Alni, L. — Dans le bois mort de chêne et d'aulne (RRR). (Pévy, Rilly, Trigny.)

PYRRIDIUM — Fairmaire.

Sanguineum, L. — Sous les écorces des branches mortes de chêne (CC). +.

CALLIDIUM. — Fabricius.

Violaceum, L. — Dans le bois de certains conifères. Un seul exemplaire capturé à Thillois.

HYLOTRUPES. — Mulsant.

Bajulus, L. — Dans les planchers, charpentes, etc., en bois résineux. Espèce vraisemblablement importée.

RHOPALOPUS. — Mulsant.

Clavipes, F. - Dans le bois mort de diverses essences (RRR) ! (Rilly.)

Femoratus, L. — Dans les branches mortes de chêne et de bouleau (RRR) !

Spinicornis, Ab. — Un seul exemplaire trouvé dans la forêt de Germaine (Frère Agylaeus).

Digitized by Google

AROMIA. — Serville.

Moschata, L. - Sur les saules (RR). +.

PURPURICENUS — Fischer.

Koehleri, L. — Dans les vignes, sur les échalas (RR). (Avize, Ludes.)

PLAGIONOTUS. — Mulsant.

Detritus, L. — Dans les chantiers de bois, sous des écorces de chêne (RRR) !

Arcuatus, L. — Sur les troncs de chênes abattus (CC) +.

Floralis, Pall. — Un exemplaire pris à Reims à proximité d'un chantier de bois.

CLYTUS. — Laichard.

Tropicus, Panz. — Dans les branches mortes de chêne (RRR). (Germaine).

Arietis, L. — Sur les buissons en fleur (CC) +.

Rhammi, Germ. — Sur les buissons en fleur; dans les champs sur les ombellifères (CC). +.

CLYTANTHUS. — Thomson.

Quadripunctatus, F. — Dans les vieilles charpentes de chêne (C). +.

Massiliensis, L. — Sur les fleurs, de préférence sur les ombellifères (CC). +.

Digitized by Google

LAMIDAE

PARMENA. - Latreille.

Fasciata, Villers. — En secouant les vieux fagots (rrr) ! (Rilly.)

DORCADION. — Dalman.

Fuliginator, L. — Au bord des chemins et des fossés sur les gazons (c). +.

LAMIA. - Fabricius.

Textor, L. — Sur les saules (c). +.

ACANTHOCINUS. — Stephens.

Aedilis, L. — Sur les troncs des vieux pins abattus (cc) +.

Atomarius, F. — Comme le précédent. Un seul exemplaire trouvé à Bazancourt (Bellevoye.)

LIOPUS. — Serville.

Nebulosus, L. — En secouant les vieux fagots d'essences diverses, chêne, charme, aulne, etc. (rr) ! (Germaine.)

EXOCENTRUS. — Mulsant.

Lusitanus, L. - Sur les tilleuls (rr). (Thillois.)

Digitized by Google

POGONOCHERUS. – Gemminger.

Bidentatus, Thoms. — En secouant les vieux fagots, les brindilles de bois mort, etc. (rr). (Verzy, Berru.)

Dentatus, Fourc. — Comme le précédent (c). +.

Ovatus, Goeze. — Comme les précédents (r). (Germaine.)

SAPERDIDAE

MESOSA. — Serville.

Curculionoides, L. — Trouvé une fois dans un chantier de bois.

Nebulosa, F. — Dans les branches mortes de chêne (r). (Germaine, Trigny, Hermonville.)

ANAESTHETHIS — Mulsant.

Testacea, L. — Un seul exemplaire trouvé à Soudron (Bouché).

AGAPANTHIA. — Serville.

Lineatocollis, Donov. — Sur diverses plantes, surtout sur *Eupatorium cannabinum* (c). +.

Cyanea, Herbst. — En fauchant dans les clairières (rr). (Germaine.)

Cardui, L. — Sur les chardons (rr) ! (Germaine.)

SAPERDA — F.

Carcharias, L. — Sur les troncs de peupliers (c). +.

Digitized by Google

Populnea, L. — En battant les peupliers (CC). +.

Scalaris, L. — Dans le bois mort de certains arbres fruitiers, le noyer surtout (RR). (Germaine, Trigny.)

TETROPS. — STEPHENS.

Praeusta, L. — Sur l'aubépine, le noisetier, le chêne, le pommier (C). +.

STENOSTOLA. — MULSANT.

Ferrea, SCHR. — En fauchant dans les clairières des bois, trouvé aussi sur le tilleul (RR). (Germaine, Pévy, Thillois.)

OBEREA. — MULSANT.

Pupillata, GYLL. — Sur le chèvrefeuille (RR). (Rilly, Trigny.)

Oculata, L. — Sur le saule (R). +.

Linearis. — Sur le noisetier (C). +.

Erythrocephala, SCHR. — Sur les euphorbes (RRR). (Rilly.)

PHYTOECIA — MULSANT.

Cylindrica, L. — Sur les ombellifères (RR)! (Rilly, Germaine, Merfy.)

Virescens, F. — Sur *Echium vulgare* (CC). +.

Digitized by Google

PHYTOPHAGES

SAGRIDAE

ORSODACNA. — Latreille.

Cerasi, L. - Sur le cerisier (RR.) (Rilly.)

Nigriceps, Latr. — Sur le cerisier; quelquefois sur l'aubépine en fleur (RR). (Rilly, Germaine.)

DONACIDAE

DONACIA. — Fabricius.

Crassipes, F. — Sur les feuilles de nénuphar (RR), +.

Bidens, Ol. — Sur les plantes aquatiques (R). (Thuisy.)

Dentata, Hope. — Au bord des eaux sur les plantes aquatiques (RR). (Rethel.)

Sparganii, Ahr. — Sur les plantes aquatiques dans les eaux courantes (RR) ! (Thuisy.).

Reticulata, Gyll. — Sur les plantes aquatiques (RR). (Fismes.)

Dentipes, F. — Comme l'espèce précédente (C), +.

Digitized by Google

Lemnae,N. — Sur les *Sparganium* (C). (Thuisy, Muizon.)

Sagittariae, F. — Sur diverses plantes aquatiques (CC) +.

Obscura, GYLL. — Comme l'espèce précédente (RR). (Trépail, Germaine.) (BELLEVOYE.)

Thalassina, GERM. — Un exemplaire trouvé dans les marais de Courcelles. (BELLEVOYE.)

Brevicornis, AHR. — Dans les endroits humides (RR.) (Germaine.) (DEMAISON.)

Menyanthidis, GYLL. — Sur les plantes aquatiques (C), +.

Linearis, HOPE. — Comme le précédent (R). (Germaine.)

Typhae, AHR. — Sur les joncs et autres plantes aquatiques (R). (Taissy, Muizon.)

Simplex, F. — Sur les plantes aquatiques (C) +.

Fennica, PAYK. — Le type ne se rencontre pas dans notre région, mais la var. *Malinowskyi* a été trouvée sur un saule à Vrilly. (DEMAISON.)

Hydrochaeridis, F. — Sur *typha latifolia* (RR). (Muizon, Thuisy.)

Discolor, HOPE. — Sur les *carex* (R), +.

Affinis, KUNZE. — Comme le précédent (R). (Muizon, Jonchery.)

Sericea, L. — Sur les plantes aquatiques (CC), +.

HAEMONIA. — LATREILLE.

Equiseti, F. — Sur les racines et les tiges profondément immergées des *potamogeton*. Trouvé en nombre dans le bassin du canal (BELLEVOYE) et dans la Vesle à Taissy. (WARNIER.)

Digitized by Google

CRIOCERIDAE

ZEUGOPHORA. – Kunze.

Scutellaris, Suff. — Sur *populus nigra* (rrr). (Saint-Brice.)
Subspinosa, F. — Sur le bouleau, le peuplier et le noisetier (c), +.
Flavicollis, Marsh. — Comme le précédent (r). (Merfy, Hermonville.)

LEMA. — Fabricius.

Cyanella, F. — En fauchant dans les prairies; quelquefois sous les écorces (cc), +.
Erichsoni, Suff. — Comme le précédent (c), +.
Flavipes, Suff. – En battant les buissons (rr). (Châlons-sur-Vesle.)
Melanopa, L. — Sur les graminées (cc), +.

CRIOCERIS. — Geoffroy.

Merdigera, L. — Sur les lys (cc), +.
Brunnea, F. — Sur le muguet (r). (Germaine, Trigny.)
Duodecim-Punctata, L. — Sur l'asperge (ccc), +.
Asparagi, L. — Comme le précédent (ccc), +.

CLYTRIDAE

CLYTRA. — Laicharting.

S. g. *Labidostomis*. (Lacordaire.)

Tridentata, L. — Sur les jeunes pousses de chêne (r). (Germaine.)

Digitized by Google

Humeralis, Panz. — Un seul exemplaire trouvé sur des graminées à Bergères-les-Vertus (Marne). (Bouché.)

Lucida, Germ. — En battant les buissons (rr) ! (Thuisy.)

Longimana, L. — Sur des céréales (c), +.

S. g. *Clytra*. (Laicharting.)

Laeviuscula, Ratz. — Sur les jeunes saules (c), +.

S. g. *Gynandrophthalma*. (Lacordaire.)

Aurita, L. — Sur le bouleau, le saule et le noisetier (r). (Germaine.)

Affinis, Rossi. — Sur les jeunes pousses de chêne (r). (Thuisy.)

Cyanea, F. — En fauchant dans les prairies (c), +.

S. g. *Cheilotoma*. (Chevrolat.)

Bucephala, Schall. — Sous les touffes de *rumex acetosella* (r) ! (Thuisy, Châlons-sur-Vesle.)

S. g. *Coptocephala*. (Chevrolat.)

Melanocephala, Ol. — Espèce d'Algérie. Un exemplaire dans la collection Bellevoye avec la mention : Condé-sur-Suippe (?)

Scopolina, L. — En fauchant dans les prairies (r). (Condé-sur-Suippe, Saint-Léonard.)

Tetradyma, Kust. — Espèce méridionale; un exemplaire de la collection Bellevoye, est étiquetée Thuisy (?)

Quadrimaculata, L. — En fauchant dans les prairies (rr). (Muizon, Thuisy.)

Digitized by Google

LAMPROSOMIDAE

LAMPROSOMA. — Kirby.

Concolor, Sturm. — Sous les mousses et les détritus végétaux (rr). (Germaine.)

CRYPTOCEPHALIDAE

CRYPTOCEPHALUS. — Geoffroy.

Coryli, L. — Sur le noisetier, le saule et le bouleau (r). (Germaine, Fère-en-Tardenois.)

Variabilis, Schneid. — Sur le saule (c). (Germaine, Trigny, Thuisy.)

Sexpunctatus, L. — Sur le saule et le noisetier (r). (Germaine, Rilly.)

Violaceus, F. — Sur l'aulne, le saule, l'alisier (c), +.

Aureolus, Suff. — En fauchant dans les prairies (cc), +.

Hypochaeridis, L. — Comme le précédent (cc), +.

Pini, L. — Sur les pins (r). (Merfy, Thuisy, Germaine.)

Nitens, L. — Sur le chêne, le saule et le bouleau (r). (Germaine, Trigny.)

Moraei, L. — En fauchant dans les prairies (cc), +.

Flavipes, L. — Sur le noisetier, le chêne, le bouleau (cc), +.

Decempunctatus, L. — Sur le saule (rr). (Thuisy.)

Punctiger, Payk. — Sur le saule et le peuplier (rr). (Rilly.)

Digitized by Google

Janthinus, GERM. — Sur le peuplier (R). (Taissy, Merfy.)

Fulcratus, GERM. — Sur l'aulne (RR). (Verzy.)

Flavilabris, PAYK. — Sur le bouleau (RR). (Courcelles, Tinqueux.)

Marginatus, F. — Sur le saule et le bouleau (RR). (Châlons-sur-Vesle, Trigny.)

Bipunctatus, L. — Comme le précédent (R). (Muizon, Thuisy.)

Bipustulatus, F. — Comme les précédents (C), +.

Sexpustulatus, ROSSI. — En fauchant dans les prairies (R). (Muizon.)

Vittatus, F. — Comme le précédent (CC), +.

Bilineatus, L. — Comme les précédents (R). (Berru, Trigny.)

Pygmaeus, SUFF. — Sur *Thymus serpillum* (RR). (Saint-Brice.)

Minutus, F. — Sur le saule et le peuplier (R). (Warmeriville.)

Pusillus, F. — Sur le chêne, le saule et le bouleau (RR). (Verzy, Muizon, Rilly.)

Gracilis, F. — Sur le saule, quelquefois sur les menthes (R). (Ay, Muizon.)

Labiatus, L. — Sur le chêne, le bouleau, le saule (CC), +.

Geminus, GYLL. — Comme le précédent (CC), +.

PACHYBRACHYS. — SUFFRIAN.

Hieroglyphicus, LAICHT. — Sur le peuplier (R). (Rilly, Trigny, Cernay.)

Digitized by Google

EUMOLPIDAE

ADOXUS. – Kirby.

Obscurus, L. — Sur *Epilobium angustifolium* (RR). (Germaine.)

Vitis, F. — Sur la vigne (CC), +.

CHRYSOCHUS. — Redtenbacher.

Pretiosus, F. — Sur *asclepias vincetoxicum* (RRR). (Germaine.)

CHRYSOMELIDAE

TIMARCHA. — Latreille.

Tenebricosa, Latr. — Sur les gazons dans les champs (C), +.

Coriaria, F. — Sous les détritus végétaux, sur les gazons, etc. (CC), +.

CHRYSOMELA. — Linné.

Goettingensis, L. — Sur *Hypericum perforatum* (RR). (Germaine).

Varians, F. — Sur les *hypericum* (C) +.

Staphylaea, L. -- Dans les prairies humides (CC), +.

Graminis, L. — Sur *tanacetum vulgare* (R). (Boult-sur-Suippe, Chamery, Ay.)

Fastuosa, L. — Sur les graminées, les labiées, dans les taillis sur les jeunes pousses (CC), +.

Digitized by Google

Violacea, Panz. — Sur les labiées (rr). (Chamery).

Menthastri, Suff. — Sur *mentha aquatica* (r). (Ay, Chamery.)

Cerealis, L. — Sur *cirsium lanceolatum, artemisia vulgaris* (c) +.

Didymata, Sch. — Sur *Hypericum perforatum* (c). (Tinqueux, Thuisy.)

Fucata, F. — Sur *Hypericum perforatum* (c), +.

Duplicata, Zenk. — Sur *Hypericum hirsutum* et *h. perforatum* (rr). (Germaine.)

Polita, L. — Sur le saule et le peuplier, ou dans les endroits marécageux sous les herbes coupées (c), +.

Limbata, F. — Sous les pierres, sur les gazons dans les champs (rr). (Rilly, Thuisy, Berru.)

Sanguinolenta, L. — Sur les graminées (cc), +.

Marginalis, Duft. — Dans les endroits sablonneux sous les pierres et divers abris (rr) ! (Gueux.)

Marginata, L. — Dans les endroits sablonneux, commune certaines années ! (Asfeld, Rilly.)

Molluginis, Suff. — Sur les *gallium* (rrr). (Châlons-sur-Vesle.)

Haemoptera, L. — Au bord des fossés, sur les gazons, sous les pierres dans les sablonnières (cc), +.

LINA. — Redtenbacher.

Aenea. L. — Sur les aulnes (c), +.

Vigintipunctata, Scop. — Trouvée une seule fois en petit nombre sur un saule dans l'île de Compertrix à Châlons-sur-Marne. Espèce vraisemblablement amenée par des détritus d'inondation.

Digitized by Google

Populi, L. — Sur le peuplier, le tremble et le saule (CCC), +.
Tremulae, F. — Sur le saule et le peuplier (CC), +.

GONIOCTENA. — Redtenbacher.

Rufipes, de Geer. — Sur les saules et les jeunes pousses de peuplier (C) +.
Viminalis, L. — Sur les saules (C) +.
Litura, F. — Sur les genêts (CC), +.

GASTROPHYSA. — Redtenbacher.

Polygoni, L. — Sur *Polygonum aviculare* (CC), +.
Raphani, Herbst. — Sur l'oseille (C), +.

PLAGIODERA. — Redtenbacher.

Armoraciae, F. — Sur le saule et le peuplier (CCC), +.

PHAEDON. — Latreille.

Pyritosus, Rossi. — Sur les fleurs de renoncule (C), +.
Cochleariae, F. — Sur les crucifères, particulièrement sur *nasturtium amphibium* et *n. palustre*.

PHRATORA. — Redtenbacher.

Vulgatissima, L. — Sur le saule (C), +.
Vittellinae, L. — Sur le saule, parfois sur le peuplier (CCC), +.
Laticollis, Suff. — Sur le peuplier (R) ! (Jonchery.)

PRASOCURIS. — Latreille.

Aucta, F. — Sur le saule et sur les fleurs de renoncule (RR). (Thuisy.)

Digitized by Google

Marginella, L. — Sur les renoncules (R) ! (Thuisy, Muizon.)

Beccabungae, ILLIG. — Sur *Veronica beccabunga*, (C) +.

Phellandrii, L. — Sur *Phellandrium aquaticum* (C). (Thuisy, Jonchery, Courcelles.)

GALLERUCIDAE

ADIMONIA. — LAICHARTING.

Tanaceti, L. — Sur les graminées (C), +.

Rustica, SCHAL. — En juin et juillet dans les prairies humides (C), +.

LOCHMAEA. — WEISE.

Capreae, L. — Dans les bois sur les bruyères, les genêts, etc. (CC), +.

Sanguinea, F. — Sur les buissons en fleur (CC), +.

GALLERUCA. — GEOFFROY.

Viburni, PAYK. — Sur *viburnum lentana* et *v. opulus* (RR). (Germaine, Merfy.)

Nympheae, L. — Sur le nénuphar (CC). +.

Lineola, F. — Dans les marais en secouant les herbes sèches, quelquefois sur les jeunes pousses de saule (R). (Muizon, Thuisy.)

Xanthomelaena, SCHR. — Sous les écorces d'orme. La larve est très nuisible aux jeunes ormeaux dont elle dévore les feuilles (CC), +.

Pusilla, DUFT. — Sur les joncs (CC), +.

Digitized by Google

AGELASTICA. — Redtenbacher.

Alni, L. — Sur les aulnes (ccc), +.

Halensis, L. — Sur les *galium* (r). (Warmeriville, Thuisy, Courcelles, Muizon.)

PHYLLOBROTICA. — Redtenbacher.

Quadrimaculata, L. — Sur les labiées (rrr). (Fismes.)

LUPERUS. — Geoffroy.

Circumfusus, Marsh. — Sur les genêts en fleur (r). (Rilly, Merfy.)

Pinicola, Duft. — Trouvé en juillet à Chamery sur des conifères (Bellevoye).

Betulinus, Fourc. — Sur les aulnes (cc), +.

Flavipes, L. — Comme le précédent (cc), +.

ALTICIDAE

CREPIDODERA. — Chevrolat.

Ventralis, Illig. — Sur *Solanum dulcamara* (c). (Courcelles, Muizon, Bazancourt.)

Salicariae, Payk. — Sur *lythrum salicaria* et *lysimachia vulgaris* (c). (Thuisy, Muizon, Germaine.)

Transversa, Marsh. — Sur les *cirsium* (cc), +.

Rufipes, L. — Sur *vicia sepium* (rr). (Germaine.)

Nitidula, L. — Sur les buissons, en juin (rr). (Rilly.)

Helxines, L. — Sur le saule et le peuplier (cc), +.

Digitized by Google

Aurata, Marsh. — Sur le peuplier (cc), +.

Chloris, Foud. — Sur le saule (cc), +.

Modeeri, L. — Sur *equisetum arvense* (r). (Rilly, Muizon, Courcelles.)

Pubescens, Koch. — Sur *solanum dulcamara* (rr). (Cormontreuil, Thuisy.)

HERMEOPHAGA. — Foudras.

Mercurialis, F. — Sur *mercurialis perennis* (rr). (Rilly.)

Cicatrix, Ill. — Sur *mercurialis perennis* (rr). (Hermonville.)

GRAPTODERA. — Chevrolat.

Lythri, Aubé. — Sur *lythrum salicaria* (c). (Thuisy, Muizon.)

Erucae, Ol. — Sur les jeunes pousses de chêne (r). (Damery.)

Oleracea, L. – Sur les crucifères (cc), +.

APHTONA. — Chevrolat.

Lutescens, Gyly. — Sur *lythrum salicaria* (r). (Saint-Brice, Ay, Germaine.)

Caerulea, Koch. — Sur les iris (c). (Germaine, Bazancourt, Thuisy.)

Cyparissiae, Hoffm. – Sur *euphorbia* **cyparissia** (r). (Gueux, Châlons-sur-Vesle.)

Atrocaerulea, Steph. — Sur *iris pseudoacorus* (r). (Muizon, Courcelles.)

Euphorbiae, Schr. — Sur *euphorbia sylvatica* (c). (Brimont, Germaine, Muizon.)

Digitized by Google

SPHAERODERMA. — Stephens.

Cardui, Gyll. — Sur les chardons (cc), +.

Testacea, F. — Sur les chardons; quelquefois sur la centaurée (c), +.

PHYLLOTRETA. — Foudras.

Antennata, Koch. — Sur *reseda lutea* (r). (Châlons-sur-Vesle, Germaine.)

Atra, Koch. — Sur les crucifères (cc), +.

Melaena, Illig. — Sur les crucifères (rr) !

Posciloceras, Comol. — Comme le précédent (rr). (Courcelles.)

Punctulata, Marsh. — Comme les précédents (rr). (Brimont.)

Nigripes, F. — Comme les précédents (r). (Ay, Muizon.)

Ochripes, Curtis. — Sur les *Sisymbrium* (c), +.

Nemorum, L. — Sur les crucifères (cc), +.

Vittula, Redt. — Sur *nasturtium amphibium* (c). (Germaine, Merfy.)

Flexuosa. Illic. — Sur les crucifères (rr). (Ay, Trigny, Germaine.)

Tetrastigma, Comol. — Dans les endroits humides sur diverses plantes (rr). (Germaine, Rilly.)

Brassicae, Illig. — Sur les choux (r). (Germaine, Thuisy.)

PODAGRICA. — Allard.

Fuscicornis, L. — Sur les *althea* (cc), +.

Digitized by Google

BATOPHILA. — Foudras.

Aerata, Marsh. — Sur les ronces (rr). (Germaine.)

Rubi, Payk. — Sur les ronces (rr). Saint-Imoges.)

PLECTROSCELIS. — Latreille.

Chlorophana, Duft. — Sur les iris (rr). (Thillois, Saint-Imoges.)

Dentipes, Hoffm. — En fauchant dans les prairies (c), +.

Tibialis, Illig. — Comme le précédent. La larve ronge les cotylédons des betteraves et en détruit beaucoup (r). (Loivre, Brimont.)

Chrysicollis, Foud. — Espèce se trouvant assez souvent dans le midi sur *Dorychium subfruticosum;* un exemplaire trouvé à Trigny en fauchant dans une prairie.

Aridula, Gyll. — En fauchant dans les endroits marécageux (c), +.

Aridella, Illig. — Comme le précédent (c), +.

BALANOMORPHA. — Chevrolat.

Rustica, Lin. — Dans les endroits marécageux, sous les débris végétaux (rr). (Thuisy, Jonchery.)

APTEROPEDA. — Redtenbacher.

Ciliata, Ol. — Dans les bois, sur les graminées (c). (Germaine, Rilly, Merfy.)

Globosa, Illig. — En fauchant dans les clairières (rr). (Germaine.)

Digitized by Google

MNIOPHILA. — Stephens.

Muscorum, Koch. — Dans les bois, sous les mousses (r). (Germaine, Trigny.)

THYAMIS. — Stephens.

Verbasci, Panz. — Sur les *verbascum* (c), +.

Melanocephala, Gyll. — En fauchant dans les prairies (c). (Saint-Brice, Merfy, Germaine.)

Atricilla, Gyll. — En fauchant sur les luzernes ; quelquefois sur les *verbascum* (cc), +.

Brunnea, Redt. — Dans les endroits marécageux, sur les plantes (r). (Muizon, Thuisy.)

Vidua, All. — Dans les prairies (rr). (Germaine.)

Laevis, Duft. — Sur les chrysanthèmes (rr). (Berru, Merfy.)

Quadripustulata, F. — En juin sur *cynoglossum officinale* (rr). (Taissy, Trigny.)

Fuscoaenea, Redt. — Sur *lithospermum arvense* et *echium vulgare* (rr) ! (Châlons-sur-Vesle.)

Pusilla, Gyll. — Sur *thymus serpyllum* (c), +.

Anchusae, Payk. — Sur *cynoglossum officinale* et *borago officinalis* (c), +.

Dorsalis, F. — Sur *salvia pratensis*; quelquefois au premier printemps après les murs (c) ! (Germaine, Châlons-sur-Vesle.)

Castanea, Foud. — Dans les endroits humides (rr). (Thuisy.)

Lurida, Scop. — Sur les boraginées (cc), +.

Digitized by Google

Nasturtii, F. — Sur *echium vulgare* (C). (Thuisy, Trigny, Germaine.)

Suturalis, MARSH. — Dans les prairies (R) ! (Ay, Thuisy.)

Thoracica, STEPH. — Dans les prairies humides (RR). (Thuisy.)

Patruelis, ALL. — Sur les *verbascum* (R) ! (Trigny).

Pellucida, FOUD. - Sur *mentha rodundifolia* et *trifolium pratense* (C), +.

Ochroleuca, MARSH. — Dans les endroits humides (RR) ! (Rilly, Muizon.)

DIBOLIA. — LATREILLE.

Timida, ILLIG. — Sur *eryngium campestre* (RR). (Pévy.)

Cynoglossi, HOFFM. — Sur *Cynoglossum officinale* (RR). (Gueux, Germaine.)

PSYLLIODES. — LATREILLE.

Crysocephala. L. — Sur les crucifères (R) ! (Germaine.)

Napi, F. — Dans les endroits humides, sur les crucifères (R). (Berru, Thuisy.)

Cuprea, HOFFM. — Dans les prairies humides (RR). (Muizon.)

Herbacea, FOUD. — Sur le saule, quelquefois sur les graminées (C). (Gueux, Châlons-sur-Vesle.)

Affinis, PAYK. — Sur *Solanum dulcamara* (C). (Thuisy, Jonchery, Trigny.)

Dulcamarae, HOFFM. — Comme le précédent (C) ! (Germaine.)

Luteola, MULL. — Sur les solanées (CC), +.

Chalcomera, ILLIG. — Sur les circium (R). (Germaine, Courcelles.)

Digitized by Google

HISPIDAE

HISPA. — Linné.

Atra, L. — Dans les endroits sablonneux, sous les gazons (cc), +.

CASSIDIDAE

CASSIDA. — Linné.

Murraea, L. — Sur *tanactum vulgare*, *Inula britannica*, *verbascum thapsus*, *Pulicaria dysenterica* (rr). (Muizon, Thuisy.)

Sanguinosa, Suff. — Sur *tanacetum vulgare* et *achillaea millefolium* (rr)! (Trigny).

Rubiginosa, Illig. — Sur *Cirsium arvense*, *C. nutans*, *C. lanceolatum*, *Onopordum acanthium* (cc), +.

Thoracica, F. — Sur *scorzonera humilis* et *cynanchum vintoxicum* (rr). (Muizon, Trigny.)

Vibex, L. — Sur *tanacetum vulgare* (c), +.

Azurea, F. — Sur *saponaria officinalis* et *silene inflata* (rrr). (Avize, Berru.)

Oblonga, Illig. — Sur *urtica dioïca* (rr). (Rilly.)

Nobilis, L. — Sur *spergula arvensis*, *stellaria graminea* (r), +.

Margaritacea, Schall. — Sur *centaurea scabiosa*, *saponaria officinalis*, *Thymus serpyllum* (r). (Bazancourt, Guignicourt, Rilly.)

Digitized by Google

Nebulosa, L. — Sur *chenopodium album* et *c. hybridum* (R) ! (Rilly, Brimont.)

Ferruginea, F. — Sur *convolvulus arvensis* (RR). (Germaine.)

Equestris, F. — Sur *cirsium oleraceum*, *Lycopus europaeus*, *mentha aquatica* (C), +.

Hemispherica, HERBST. — Sur *succisa pratensis* (RR). (Merfy.)

Digitized by Google

EROTYLIENS

ENGIS. — Paykul.

Humeralis, F. — Sous les écorces d'orme (C), +.

TRIPLAX. — Paykul.

Russica, L. — Dans les bolets; quelquefois sous les écorces (R)! (Taissy, Rilly, Berru.)

Collaris, Schal. — Dans les bolets (RRR). (Berru.)

TRITOMA. — Fabricius.

Bipustulata, F. — Dans les bolets, le bois pourri, sous les vieilles écorces (R), +.

Digitized by Google

ENDOMYCHIDES

LYCOPERDINA. — Latreille.

Bovistae, F. — Dans les *lycoperdon* (R). (Berru, Châlons-sur-Vesle, Brimont.)

ALEXIA. — Stephens.

Pilifera, Muls. — Dans le bois pourri ; quelquefois dans les champignons (RR). (Châlons-sur-Vesle, Rilly, Chigny.)

Digitized by Google

COCCINELLIDES

HIPPODAMIA. — Chevrolat.

Tredecimpunctata, L. — Dans les endroits marécageux, sous les herbes, les buissons, etc. (RR). (Germaine, Ay, Berru.)

ADONIA. — Mulsant.

Mutabilis, Scrib. — En fauchant dans les bois et les prairies (CC), +.

ANISOTICTA. — Duponchel.

Novemdecimpunctata, L. — Dans les endroits humides, sur les plantes, surtout sur les feuilles de **typha** (CC), +.

ADALIA. — Mulsant.

Bipunctata, L. — Sur les aulnes, et en général sur toutes les plantes où se trouvent des pucerons (CCC), +.

Undecimnotata, Schneid. — Sur les carduacées (C). (Rilly, Merfy, Thuisy.)

Digitized by Google

HARMONIA. — Mulsant.

Marginepuctata, Sch. — Sur les pins (cc), +.

Impustulata, L. — En fauchant dans les prairies ; en battant les buissons, surtout les aubépines (cc), +.

COCCINELLA. — Linné.

Quatuordecimpustulata, L. — En fauchant dans les prairies, en battant les saules (c), +.

Variabilis, F. — Sur les buissons en fleur; en fauchant dans les prairies et les bois (ccc), +.

Hieroglyphica, L. — Sur les bruyères (rr). (Trigny, Germaine.)

Quinquepunctata, L. — Sur les pins (c). (Rilly, Merfy, Berru.)

Septempunctata, Ol. — En battant les arbres et les buissons (r). (Germaine, Brimont, Trigny.)

MICRASPIS. — Chevrolat.

Duodecimpunctata, L. — Sur les plantes et les buissons en fleur (cc), +.

ANATIS. — Mulsant.

Ocellata, L. — Sur les jeunes pins en fleur (c). (Châlons-sur-Vesle, Trigny, Germaine.)

MYSIA. — Mulsant.

Oblongoguttata, L. — Sur les pins (cc), +.

Digitized by Google

HALYSIA. — Mulsant.

Sedecimguttata, L. — Sur les pins et les saules, trouvé une fois en nombre sous des feuilles sèches d'orme en hiver (cc), +.

VIBIDIA. — Mulsant.

Duodecimguttata, Poda. — Sur les buissons, surtout sur les noisetiers (cc), +.

Decemguttata, L. — Sur les pins et les tilleuls (rr) ! (Germaine, Merfy.)

CALVIA. — Mulsant.

Quatuordecimguttata, L. — Sur l'aulne et le saule (r). (Merfy, Germaine, Thuisy.)

SOSPITA. — Mulsant.

Tigrina, L. — Sur l'aulne (rrr) ! (Rilly.)

MYRRHA. — Mulsant.

Octodecimguttata, L. — Sur les pins (c). (Merfy, Berru.)

THEA — Mulsant.

Vigintiduopunctata, L. — Sur l'aulne (cc), +.

PROPYLEA. — Mulsant.

Conglobata, L. — Sur les buissons, les plantes en fleur (cc), +.

Digitized by Google

CHILOCORUS. — Leach.

Renipustulatus, Scriba. — Sur les arbustes en fleur, les arbres fruitiers surtout (r). (Germaine.)

Bipustulatus, L. — Comme le précédent (c), +.

EXOCHOMUS. — Redtenbacher.

Quadripustulatus, L. — Sur les plantes en fleur, surtout sur les graminées (c), +.

Auritus, Scriba. — Comme le précédent (r). (Thuisy, Muizon.)

HYPERASPIS. — Chevrolat.

Reppensis, Herbst. — En fauchant dans les endroits marécageux (r). (Muizon, Thuisy.)

EPILACHNA. — Chevrolat.

Argus, Fourcroy. — Sur *bryonia dioïca* (rr). (Châlons-sur-Marne.)

LASIA. — Hope.

Globosa, Schnd. — Sur les légumineuses (cc), +.

PLATYNASPIS. — Redtenbacher.

Villosa, Fourc. — Sur les buissons, sur le saule surtout (c), +.

COCCIDULA. — Kugelann.

Scutellata, Herbst. — Sur les plantes aquatiques (c), +.

Rufa, Herbst. — Comme le précédent (cc), +.

Digitized by Google

RIZOBIUS. — Stephens.

Litura, F. — Dans les détritus d'inondation (RR). (Ay.)

SCYMNUS. — Kugelann.

Haemorrhoidalis Herbst. — Sur les buissons et les plantes en fleur (C) ! (Thuisy, Germaine.)

Capitatus, F. — Sur les pins (RR). (Pévy.)

Fasciatus, Fourc. — Dans les prairies; en battant les saules (RR) ! (Berru.)

Discoideus, Illig. - En battant les arbres, surtout les chênes (C), +.

Nigrinus, Kugel. — Sur le chêne et le sapin (RR). (Pévy.)

Abietis, Payk. — Sur les pins (RR). (Châlons-sur-Marne (?).

Frontalis, F. — Sur le saule (RR) (Tinqueux.)

Marginalis, Rossi. — Sur les pins (C). (Merfy, Châlons-sur-Vesle, Bazancourt.)

Quadrilunulatus, Illig. — Sur le lierre (C) ! (Pévy).

Digitized by Google

Digitized by Google

ERRATA

Page 4, ligne 13, au lieu de :
♂ femelle, lisez : ♀ femelle.

Page 12, ligne 21, au lieu de :
BRACHINUS, lisez : **BRACHYNUS**.

Page 14, ligne 20, au lieu de :
Foveloa, lisez : **Foveola**.

Page 16, ligne 25, au lieu de :
Châlons 1894, lisez : Châlons 1844.

Page 28, ligne 8, au lieu de :
FAIRMAIRE & LALOULBÈNE, lisez : FAIRMAIRE & LABOULBÈNE.

Page 34, ligne 23, au lieu de :
Ferrigineus, lisez : **Ferrugineus**.

Page 35, ligne 19, au lieu de :
Dusdecimpustulatus, lisez : **Duodecimpustulatus**.

Page 38, ligne 15, au lieu de :
(TR), lisez : (RR').

Page 49, ligne 17, au lieu de :
FAIRM. lisez : FAIRM.

Page 53, ligne 9, au lieu de :
Puichella, lisez : **Pulchella**.

Page 65, ligne 16, au lieu de :
Melanocophala, lisez : **Melanocephala**.

Digitized by Google

Page 84, ligne 3, au lieu de :
STEPHEAS, lisez : STEPHENS.

Page 92, ligne 2, au lieu de :
Salanum dulcamara, lisez : *Solanum dulcamara.*

Page 104, ligne 20, au lieu de :
MEGOTOMA, lisez : **MEGATOMA.**

Page 133 :
Après le nom de tribu CIIDAE, ajoutez le nom de genre : **CIS.** — LATREILLE.

Page 138, ligne 13, au lieu de :
(CC), lisez : (RR).

Page 143, ligne 8, au lieu de :
Brevicanda, lisez : **Brevicauda.**

Page 145, ligne 5, au lieu de :
Sur le paroi, lisez : Sur la paroi.

Page 161, ligne 5, au lieu de :
Exarutus, lisez : **Exaratus.**

Page 164, ligne 28, au lieu de :
Les Campanules, lisez : Sur les Campanules.

Page 165, ligne 17, au lieu de :
CENTORYNCHIDAE, lisez : CEUTORHYNCHIDAE.

Page 184, ligne 7, au lieu de :
PRIONDUS, lisez : **PRIONUS.**

Digitized by Google

TABLE

DES GENRES ET DES SOUS-GENRES

A

Abax 23
Acalles 160
Acanthocinus 190
Achennium 64
Acidota 72
Acilius 32
Acinopus 18
Acmaeops. 185
Acritus 88
Actobius 59
Aculpalpus 21
Adalia. 21
Adelosia 21
Adimonia 202
Adonia 213
Adoxus 199
Adrastus 122
Aeraphilus 97
Aetophorus 13
Agabus 33
Agapanthia 191
Agathidium 83
Agelastica. 203
Agonum 26
Agrilus 117
Agriotes. 122
Agyrtes 81
Aleochara 46
Alexia. 212
Alophus. 153
Alosterna 186
Alphitobius 138
Amalus 170
Amara 23
Amara. 24
Ammoecius 112
Amphimallus. 114
Amphotis 91
Anacaena 40
Anaesthetis 191
Anaspis. 142
Anatis. 214
Anchomenus 26

Digitized by Google

Anisodactylus 19
Anisoplia 115
Anisosticta 213
Anisotoma 82
Anisoxya 140
Anobium 134
Anomala 115
Anommatus 100
Anoncodes 145
Anoplus 159
Anthaxia 117
Antherophagus 97
Anthicus 143
Anthobium 73
Anthocomus 128
Anthonomus 161
Anthophagus 71
Anthrenus 105
Apate 132
Aphanisticus 118
Aphodius 110
Aphthona 204
Apion 171
Apoderus 174
Apteropeda 206
Argutor 22
Aristus 15
Aromia 189
Asclera 145
Asemum 187
Asida 137
Aspidiphorus 135
Astrapaeus 58
Athous 120
Atomaria 98
Attagenus 104
Attelabus 174
Aulonium 95
Autalia 45
Axinotarsus 128

B

Badister 18
Bagous 159
Balaninus 161
Balanomorpha 206
Baptolinus 62
Baridius 170
Barynotus 151
Barypeithes 149
Batophila 206
Bembidium 28
Bembidium 28
Berosus 41
Bidessus 35
Bitoma 95
Blaps 137
Blastophagus 181
Blechrus 14
Bledius 69
Blethisa 9
Bolitobius 55
Bolitochara 45
Bothrideres 95
Bothynoderes 155
Brachonyx 159
Brachynus 12
Brachypterus 89
Brachytarsus 177
Bracteon 28
Bradycellus 19
Bradytus 25
Brontes 96
Broscus 18
Bruchus 178
Bryaxis 75

Digitized by Google

Byrrhus 106
Bythinus 76
Byturus 104

C

Calathus 25
Callicerus 48
Callidium 188
Callistus 16
Calodera 48
Calosoma 11
Calvia 215
Calyptomerus 83
Cantharis 145
Carabus 10
Cardiophorus 120
Carpophilus 90
Cassida 209
Catops 81
Celia 24
Cephennium 78
Cerambyx 187
Cerapheles 128
Cercus 89
Cercyon 43
Cerocoma 144
Cerylon 96
Cetonia 115
Ceutorhynchidius . . . 168
Ceutorhynchus 167
Charopus 129
Cheilotoma 196
Chilocorus 216
Chlaenius 16
Chlorophanus 151
Choleva 80
Chrysanthia 146
Chrysochus 199
Chrysomela 199
Cicindela 7
Cidnorhinus 166
Cionus 165
Cis 133
Cissophagus 181
Cistela 139
Clambus 83
Claviger 76
Cleonus 154
Clerus 131
Clivina 15
Clytanthus 189
Clytra 195
Clytra 196
Clytus 189
Cnemidotus 38
Cneorhinus 151
Coccidula 216
Coccinella 214
Cochiastes 166
Coelambus 35
Coeliodes 166
Colenis 82
Colobopterus 110
Colymbetes 32
Conurus 55
Copelatus 33
Coprimorphus 110
Copris 109
Coprophilus 71
Coptocephala 196
Corticaria 101
Cortodera 185
Corylophus 84
Corymbites 121
Corynetes 132
Coryssomerus 163

Digitized by Google

Cossonus 171
Coxelus 95
Creophilus. 58
Crepidodera. 203
Crioceris 195
Cryphalus. 182
Cryptarcha 93
Crypticus 137
Cryptobium 64
Cryptocephalus 197
Cryptohypnus. 119
Cryptophagus. 98
Cryptopleurum 44
Cryptorhynchus. . . . 160
Crypturgus 182
Cteniopus. 140
Cybister. 31
Cychramus 93
Cychrus. 11
Cyclonotum 43
Cyllidium 41
Cymindis 13
Cyphon 124
Cyrtonotus 24
Cytilus 106

D

Danacaea 130
Dascillus 123
Dasycerus. 102
Dasytes 129
Deleaster 71
Demetrias. 13
Dendrophilus 87
Dermestes. 104
Deronectes 35
Diachromus 19
Dianous. 66
Diaperis. 138
Dibolia 208
Dinarda. 47
Diodesma 95
Diodyrhynchus 176
Dolichosoma. 130
Dolopius 122
Donacia. 193
Dorcadion 190
Dorcatoma. 135
Dorcus 108
Dorytomus 158
Drilus. 125
Dromius. 13
Dryophilus 134
Drypta 12
Dyschirius 15
Dytiscus 31

E

Ebaeus 129
Elaphrus 8
Elater. 119
Elleschus 157
Elmis 107
Emus 58
Engis 211
Ennearthron. 133
Epilachna 216
Epistemus. 100
Epuraea. 90
Erirrhinus. 158
Ernobius 134
Eubria 124
Eucnemis 119
Euplectus 76
Eutheia 78
Evaesthetus. 66

Digitized by Google

Exocentrus 190
Exochomus 216

F

Falagria. 45
Feronia 21
Foucartia 149

G

Galeruca. 202
Gastrallus. 134
Gastrophysa. 201
Georyssus. 106
Geotrupes. 113
Gibbium. 136
Gnorimus 116
Gonioctena. 201
Gonodera. 139
Gracilia 187
Grammoptera 186
Graptodera 204
Grypidius 157
Gymnetron 164
Gymnopleurus. 109
Gynandrophthalma . . . 196
Gyrinus 38
Gyrophaena. 53

H

Habrocerus 54
Hadrotoma 105
Haemonia 194
Haliplus. 37
Halysia 215
Haplocnemus 130
Haploderus 71
Harmonia 214
Harpalus 20
Hedobia. 135
Helochares 40
Helodes 123
Helophorus 41
Helops 139
Heptaulacus. 112
Hermaeophaga 204
Hesperophanes 187
Hetaerius 87
Heterocerus 107
Heterothops 56
Hippodamia 213
Hispa 209
Hister. 86
Homaloplia 114
Homalota 49
Homoeusa. 46
Hoplia. 113
Hydaticus 32
Hydnobius. 82
Hydraena 42
Hydrobius. 39
Hydrochus. 42
Hydronomus 159
Hydrophilus. 39
Hydroporus 36
Hydrous. 39
Hygronoma 52
Hylastes 180
Hylecoetus 132
Hylesinus. 181
Hylobius 156
Hylotrupes 188
Hylurgus 180
Hymenalia 139
Hyphebaeus. 129
Hypera 153
Hyperaspis 216

Digitized by Google

Hyphydrus 34
Hypocyptus 54
Hypophloeus 138

I

Ilybius 33
Ips 93
Isomira 140

J

Judolia 185

L

Labidostomis 195
Laccobius 40
Laccophilus 34
Lacon 119
Laemophloeus 96
Lagarus 22
Lagria 141
Lamia 190
Lamprosoma 197
Lampyris 124
Langelandia 100
Larinus 156
Lasia 216
Lasioderma 135
Lathrimaeum 72
Lathrobium 63
Latridius 100
Lebia 14
Leistotrophus 58
Leistus 9
Lema 195
Leptacinus 62
Leptidea 187
Leptura 185
Leptusa 46
Lepyrus 156
Lesteva 72
Leucoparyphus 54
Leucosomus 155
Licinus 17
Lignyodes 163
Limnebius 41
Limobius 154
Limonius 120
Lina 200
Liodes 82
Liophloeus 151
Liopus 190
Liosomus 152
Litargus 103
Lithocharis 65
Lixus 155
Lochmaea 202
Lomechusa 47
Loricera 16
Lucanus 108
Ludius 121
Luperus 203
Lycoperdina 212
Lyctus 133
Lyperus 22

M

Magdalinus 160
Malachius 128
Malthinus 127
Malthodes 127
Mecaspis 154
Mecinus 164
Megapenthes 119
Megarthrus 74
Megesternum 44
Megatoma 104

Digitized by Google

Melandria 141
Melanotus 120
Melasis 118
Meligethes 92
Meloe 144
Melolontha 115
Mesosa 191
Metabletus 14
Micraspis 214
Micrelus 168
Microcara 123
Microglossa 46
Micropeplus 74
Microzoum 138
Minyops 152
Mniophila 207
Molops 23
Molytes 152
Mononychus 165
Monotoma 102
Mordella 142
Mordellistena 143
Morychus 106
Mycetaea 102
Mycetochares 140
Mycetophagus 103
Mycetoporus 56
Mycterus 146
Mylacus 148
Myllaena 53
Myrmedonia 47
Myrmekixenus 102
Myrmetes 88
Myrrha 215
Mysia 214

N

Nanophyes 165
Nebria 9
Necrobia 132
Necrophorus 79
Necydalis 186
Nedyus 166
Nephanes 85
Niptus 136
Nitidula 91
Nosodendron 105
Notaphus 28
Noterus 34
Notiophilus 8
Notoxus 143

O

Oberea 192
Obrium 187
Ochina 134
Ochtebius 42
Octotemnus 133
Ocypus 59
Ocys 30
Ocyusa 48
Odacantha 12
Odontaeus 112
Oedemera 145
Olibrus 88
Oligota 53
Olisthopus 27
Olophrum 72
Omalium 72
Omalisus 125
Omaseus 22
Omophron 8
Omosita 91
Onthophagus 109
Onthophilus 88
Oodes 17

Digitized by Google

Opatrum. 138
Ophonus 19
Opilus. 131
Orchesia 140
Orchestes 162
Orobitis 160
Orsodacna. 193
Orthoperus 84
Oryctes 115
Othius. 62
Otiorhynchus 147
Oxyomus 112
Oxypoda. 49
Oxyporus 69
Oxytelus 70
Oxythyrea. 116

P

Pachybrachys 198
Pachyrhinus. 170
Pachytychius 157
Paederus 65
Panagaeus. 16
Parmena. 190
Parnus 107
Pelobius. 37
Pelonomus 169
Peritelus 148
Peryphus. 29
Phaedon. 201
Phalacrus 88
Philhydrus 40
Philochtus 30
Philonthus. 60
Phloeobium 74
Phloeophthorus 181
Phlaeopora 52
Phloeosinus 181
Phloeotribus. 181
Phosphaenus 125
Phratora. 201
Phyllobius. 148
Phyllobrotica 203
Phyllopertha. 115
Phyllotreta 205
Phymatodes 188
Phytoecia 192
Pissodes. 157
Pitiophthorus 182
Placusa 52
Plagiodera. 201
Plagiogonus 111
Plagiographus. 154
Plagionotus 189
Platambus. 34
Platycerus. 108
Platydema. 138
Platynaspis 216
Platysma 22
Platystethus. 70
Platystarsus. 149
Plectroscelis. 206
Plinthus. 152
Pacadius 93
Podagrica. 205
Poecilus 21
Pogoncherus 191
Polydrosus 148
Polysticus. 12
Poophagus 169
Potaminus. 107
Prasocuris. 201
Pria. 92
Prionus 184
Prionychus 140
Pristonychus 25

Digitized by Google

Procrustes. 9
Propylea 215
Proteinus 73
Psammobius. 112
Psammoecus 97
Pselaphus. 75
Pseudocistela 139
Pseudostyphlus . . . 157
Psilothrix 130
Psylliodes. 208
Ptenidium. 85
Pterostichus 23
Ptilinus 134
Ptilium 85
Ptinella 84
Ptinus. 135
Purpuricenus 189
Pyrochroa. 141
Pyrridium. 188
Pytiophagus. 94

Q

Quedius 57

R

Rhagium 184
Rhagonycha. 126
Rhamnusium 185
Rhamphus. 163
Rhantus 32
Rhinocyllus 156
Rhinomacer 176
Rhinoncus 169
Rhinosimus 141
Rhizobius 217
Rhizophagus 94
Rhizotrogus 114
Rhopalodontus 133
Rhopalopus 188
Rhynchites 175
Rhyncolus 171
Rhytideres 154
Rhytidosoma 169

S

Saperda. 191
Salpingus 141
Saprinus 87
Sarrotrium 95
Scaphidium 85
Scaphisoma 86
Scaphium 85
Schistoglossa 52
Sciaphilus. 149
Scirtes 124
Scolytus 181
Scopaeus 64
Scraptia. 142
Scydmaenus. 77
Scymnus 217
Serica. 114
Sericoderus 83
Serropalpus. 140
Sibynia 163
Silaria 143
Silis. 127
Sylpha 79
Silusa 46
Silvanus 96
Sinodendron. 108
Sisyphus 109
Sitaris. 145
Sitones 150
Sitophilus. 171
Smicronyx 157
Sogines 21

Digitized by Google

Soronia 91
Sospita 215
Spermophagus 179
Sphaeridium 43
Sphaeroderma 205
Sphenophorus 170
Sphodrus 25
Spondylis 184
Staphilinus 58
Stenocharus 165
Stenolophus 20
Stenopterus 187
Stenostola 192
Stenura 186
Stenus 66
Steropus 23
Stilicus 64
Stomis 18
Strophosomus 150
Sunius 65
Symbiotes 103
Synaptus 122
Syncalypta 105

T

Tachinus 54
Tachyporus 55
Tachypus 28
Tachys 30
Tachyusa 48
Tanymecus 151
Tanysphyrus 159
Taphria 26
Tapinotus 169
Tarsostenus 131
Telephorus 125
Telmatophilus 97
Tenebrio 139
Tetrops 192
Teuchestes 110
Thalycra 91
Thamiocolus 167
Thea 215
Thiasophila 46
Throscus 118
Thyamis 207
Thymalus 95
Tillus 131
Timarcha 199
Tiresias 105
Tomicus 182
Toxotus 185
Trachyphloeus 151
Trachys 118
Trechus 27
Triaena 23
Tribolium 138
Trichius 116
Trichodes 132
Trichopteryx 84
Triphyllus 103
Triplax 211
Tritoma 211
Trogophloeus 71
Trogosita 94
Tropideres 177
Tropinota 116
Tropiphorus 152
Trox 113
Tychus 75
Typhaea 103

U

Urodon 179

Digitized by Google

V

Vadonia 185
Valgus 116
Vibidia 215

X

Xantholinus. 62
Xestobium 134
Xyleborus. 183
Xyletinus 135
Xylocleptes 182
Xylophilus 142

Z


Zabrus 23
Zeugophora 195

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google





Digitized by Google